

Nom scientifique (TaxRef 16)	CD TaxRef 16	Nom vernaculaire	Espèces régl.	Liste EEE Bretagne 2024	Liste EEE Bretagne 2016	Chang.
<i>Abies alba</i> Mill., 1768	79319	Sapin pectiné		IP5		Ajout
<i>Acacia dealbata</i> Link, 1822	79691	Mimosa argenté		IP5	IP5	
<i>Acanthus mollis</i> L., 1753	79721	Acanthe molle		AS6		Ajout
<i>Acer negundo</i> L., 1753	79766	Erable négondo		AS6	AS5	Modification
<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	79783	Erable sycomore		IA1i	IP5	Modification
<i>Achillea filipendulina</i> Lam., 1783	79890	Achillée à feuilles de Fougère		AS2		Ajout
<i>Aesculus hippocastanum</i> L., 1753	80334	Marronnier d'Inde		NI	AS5	Suppression
<i>Agave americana</i> L., 1753	80383	Agave d'amérique		AS5		Ajout
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	80824	Ailante glanduleux	UE/FR	IP2	IP2	
<i>Allium ampeloprasum</i> L., 1753	81313	Carambole		AS6		Ajout
<i>Allium triquetrum</i> L., 1753	81538	Ail triquètre		IA1i	IA1e	Modification
<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Duby, 1828	81567	Aulne cordé		AS2		Ajout
<i>Amaranthus powellii</i> subsp. <i>powellii</i> S.Watson, 1875	961574	Amarante de Powell		NI	AS2	Suppression
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753	82080	Ambroisie à feuilles d'armoise	Dep22/29/35/56	IP3	IP3	
<i>Ambrosia psilostachya</i> DC., 1836, cité <i>Ambrosia coronopifolia</i>	610847	Ambroisie vivace	Dep22/29/35/56	AS1	AS1	
<i>Amorpha fruticosa</i> L., 1753	82164	Faux-indigo		AS6		Ajout
<i>Anchusa officinalis</i> L., 1753	82391	Buglosse officinale		AS5		Ajout
<i>Anthemis maritima</i> L., 1753	82856	Camomille maritime		IP5	IP5	
<i>Aponogeton distachyos</i> L.f., 1782	83232	Aponogéton odorant		DD		
<i>Arctotheca calendula</i> (L.) Levyns, 1942	83529	Arctothèque souci		AS6	AS5	Modification
<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte, 1877	84057	Armoise de chine		AS5	AS5	
<i>Arundo donax</i> L., 1753	84173	Canne de provence		AS5		Ajout
<i>Asclepias syriaca</i> L., 1753	84251	Asclépiade de Syrie	UE/FR	AS5		Ajout
<i>Atriplex halimus</i> L., 1753	85068	Arroche halime		AS5		Ajout
<i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783	85469	Azolle fausse-fougère		IA1i	IA1i	
<i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753	85474	Séneçon en arbre	UE/FR/Dep56/35	IA1i	IA1i	
<i>Berberis aquifolium</i> Pursh, 1814, cité <i>Mahonia aquifolium</i> (L.) DC.	85763	Mahonia à feuilles de houx		AS5	AS5	
<i>Berberis darwinii</i> Hook., 1852	85767	Vinettier de Darwin		NI	AS6	Suppression
<i>Berteroa incana</i> (L.) DC., 1821	85795	Alysson blanc		NI	AS5	Suppression
<i>Bidens connata</i> Muhl. ex Willd., 1803	85949	Bident à feuilles connées		AS5	AS5	
<i>Bidens frondosa</i> L., 1753	85957	Bident à fruits noirs		IA1i	IA1i	
<i>Bidens radiata</i> Thuill., 1799	85978	Bident radié		IP5		Ajout

<i>Bothriochloa barbinodis</i> (Lag.) Herter, 1940	86167	Barbon andropogon		AS2		Ajout
<i>Brassica napus</i> L., 1753	86399	Colza		AS2		Ajout
<i>Briza maxima</i> L., 1753	86489	Grande amourette		AS6		Ajout
<i>Bromopsis inermis</i> (Leyss.) Holub, 1973	86513	Brome sans arêtes		AS5		Ajout
<i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887	86869	Buddleia de david		IP2	IP2	
<i>Canna indica</i> L., 1753	87776	Canna / Conflore		AS5		Ajout
<i>Carpobrotus acinaciformis</i> (L.) L.Bolus, 1927	89211	Griffe de sorcière à feuilles en sabre		IA1i	IA1i	
<i>Carpobrotus acinaciformis</i> x <i>Carpobrotus edulis</i>	610840	Griffe de sorcière hybride		IA1i	IA1i	
<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N.E.Br., 1926	89212	Griffe de sorcière		IA1i	IA1i	
<i>Cenchrus flaccidus</i> (Griseb.) Morrone, 2010	788795	Cenchrus pendant		AS2		Ajout
<i>Cenchrus longisetus</i> M.C.Johnst., 1963	717122	Cenchrus à soies longues		AS6		Ajout
<i>Cenchrus macrourus</i> (Trin.) Morrone, 2010	788874	Cenchrus à longue queue		AS6		Ajout
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC., 1805	89888	Centranthe rouge		AS2		Ajout
<i>Cerastium tomentosum</i> L., 1753	90111	Céraiste tomenteux		IP5		Ajout
<i>Ceratochloa cathartica</i> (Vahl) Herter, 1940, cité <i>Bromus wil</i>	90192	Brome cathartique		AS2	AS2	
<i>Claytonia perfoliata</i> Donn ex Willd., 1798	91848	Claytonie perfoliée		IP5	IP5	
<i>Cornus sanguinea</i> subsp. <i>australis</i> (C.A.Mey.) Jáv., 1978	892320	Cornouiller austral		AS6		Ajout
<i>Cornus sericea</i> L., 1771	159937	Cornouiller soyeux		AS6	IP5	Modification
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 19	92572	Herbe de la Pampa	FR	IA1i	IA1i	
<i>Cotoneaster coriaceus</i> Franch., 1890	717150	Cotonéaster laiteux		AS5		Ajout
<i>Cotoneaster franchetii</i> Bois, 1902	92658	Cotonéaster de franchet		IP5	IP5	
<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne., 1879	92663	Cotonéaster horizontal		IP5	IP5	
<i>Cotoneaster symondsii</i> Standish ex T.Moore, 1861, cité <i>Coto</i>	993912	Cotonéaster de simons		IP5	IP5	
<i>Cotoneaster</i> x <i>watereri</i> Exell, 1928	92717	Cotonéaster de Waterer		IP5	IP5	
<i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook.f., 1853	92722	Cotule australe		AS2		Ajout
<i>Cotula coronopifolia</i> L., 1753	92723	Cotule à feuilles de sénébière		IP5	IP5	
<i>Crassula helmsii</i> (Kirk) Cockayne, 1907	92793	Crassule de helms	FR	IA1i	IA1i	
<i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm., 1913	93129	Crépide sacrée		AS4	AS4	
<i>Crocasmia</i> x <i>crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br., 1932	93200	Crocasmie commune		IP5	IP5	
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw., 1847	93585	Cyprés de lambert		AS5		Ajout
<i>Cuscuta scandens</i> Brot., 1804, cité <i>Cuscuta australis</i> R.Br. d	93644	Cuscute volubile		IP5	IP5	
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam., 1791	93923	Souchet robuste		IP5	AS5	Modification
<i>Cyperus esculentus</i> L., 1753	93924	Souchet comestible		AS2	IP2	Modification
<i>Cyperus esculentus</i> var. <i>leptostachyus</i> Boeckeler, 1870	145857	Souchet a epi mince		DD		

<i>Cytisus multiflorus</i> (L'Hér.) Sweet, 1826	94142	Genêt à fleurs nombreuses		AS5		Ajout
<i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm., 1944	94168	Genêt strié		AS2		Ajout
<i>Datura stramonium</i> L., 1753	94489	Stramoine		IP3	IP3	
<i>Delairea odorata</i> Lem., 1844, cité <i>Senecio mikanioides</i> Otto	94560	Séneçon grimpant		IP5	AS5	Modification
<i>Delosperma cooperi</i> (Hook.f.) L.Bolus, 1927	94562	Pourpier de Cooper		AS2		Ajout
<i>Digitaria aequiglumis</i> (Hack. & Arechav.) Parodi, 1922	94969	Digitaire à glumes égales		IP5		Ajout
<i>Dipsacus laciniatus</i> L., 1753	95151	Cardère à feuilles découpées		AS5		Ajout
<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter, 1973	95187	Inule visqueuse		AS5		Ajout
<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants, 2002, c	611753	Chénopode fausse-ambrosie		AS5	AS5	
<i>Egeria densa</i> Planch., 1849	95823	Egérie dense		IA1/3i	IA1/3i	
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L., 1753	95831	Olivier de bohème		AS5	IP5	Modification
<i>Elaeagnus x submacrophylla</i> Servett., 1908	611221	Chalef d'Ebbinge		IA1i	IP5	Modification
<i>Eleocharis bonariensis</i> Nees, 1840	95895	Scirpe de buenos aires		IP5	AS5	Modification
<i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803	95980	Elodée du Canada		IP5	AS4	Modification
<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St.John, 1920	95983	Elodée de Nuttall	UE/FR	IA1i	IP5	Modification
<i>Epilobium brachycarpum</i> C.Presl, 1831	96143	Épilobe d'automne		AS2	AS2	
<i>Epilobium ciliatum</i> Raf., 1808	96149	Épilobe ciliée		NI	IP5	Suppression
<i>Eragrostis curvula</i> (Schrud.) Nees, 1841	96591	Éragrostis courbé		AS5		Ajout
<i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees, 1841	96624	Eragrostide pectinée		AS5		Ajout
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804	96739	Vergerette annuelle		AS5		Ajout
<i>Erigeron bonariensis</i> L., 1753	96746	Vergerette de Buenos Aires		NI	AS5	Suppression
<i>Erigeron canadensis</i> L., 1753, cité <i>Conyza canadensis</i> (L.) C	96749	Vergerette du canada		AS5	AS5	
<i>Erigeron floribundus</i> (Kunth) Sch.Bip., 1865, cité <i>Conyza ca</i>	611690	Vergerette à fleurs nombreuses		IP5	AS2	Modification
<i>Erigeron karvinskianus</i> DC., 1836	96775	Pâquerette des murailles		AS2	AS5	Modification
<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810, cité <i>Conyza canadensis</i> (L)	96814	Vergerette de sumatra		AS5	AS5	
<i>Eschscholzia californica</i> Cham., 1820	97346	Pavot de californie		AS2		Ajout
<i>Euonymus japonicus</i> L.f., 1780	448138	Fusain du japon		AS5		Ajout
<i>Euphorbia myrsinites</i> L., 1753	97585	Euphorbe de Corse		AS5		Ajout
<i>Fallopia baldschuanica</i> (Regel) Holub, 1971, cité <i>Fallopia a</i>	97961	Renouée du turkestan		IP5	AS5	Modification
<i>Galega officinalis</i> L., 1753	99260	Galéga officinal		AS6	AS6	
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav., 1795	99358	Passerage didyme		NI	AS6	Suppression
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav., 1798	99359	Galinsoga glabre		NI	AS6	Suppression
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn., 1791	99700	Gazanie splendide		AS5		Ajout
<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb., 1805	100603	Galinsoga cilié		NI	AS6	Suppression

<i>Hedypnois rhagadioloides</i> (L.) F.W.Schmidt, 1795	100813	Hédypnoïs de crête		AS2		Ajout
<i>Helianthus x laetiflorus</i> Pers., 1807	101056	Hélianthe vivace		AS5		Ajout
<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier, 1895	101286	Berce du caucase	UE/FR	IP3	IP3	
<i>Hippophae rhamnoides</i> L., 1753	102863	Argousier		IP5		Ajout
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss., 1847	102876	Roquette bâtarde		IP5		Ajout
<i>Hyacinthoides x massartiana</i> Geerinck, 1996	611165	Jacinthe		AS2		Ajout
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f., 1782	103139	Hydrocotyle fausse renoncule	UE/FR	IA1e	IA1e	
<i>Hypericum hircinum</i> L., 1753	103286	Millepertuis à odeur de bouc		IP5		Ajout
<i>Impatiens balfourii</i> Hook.f., 1903	103543	Balsamine de balfour		IP5	IP5	
<i>Impatiens capensis</i> Meerb., 1775	103545	Balsamine du Cap		IP5		Ajout
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833	103547	Balsamine de l'himalaya	UE/FR	IA1i	IA1e	Modification
<i>Impatiens parviflora</i> DC., 1824	103557	Balsamine à petites fleurs		AS5	AS5	
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth, 1787	521639	Ipomée pourpre		AS5		Ajout
<i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelser & Meijden, 2005, cité <i>Senecio</i>	610643	Cinénaire maritime		IA1i	IA1i	
<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799	104353	Jonc ténu		AS4	AS4	
<i>Koenigia polystachya</i> (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Revea	883894	Renouée à épis nombreux	FR	IP5	IA1i	Modification
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787	104716	Cytise faux-ébénier		AS5		Ajout
<i>Lagarosiphon major</i> (Ridl.) Moss, 1928	104805	Grand lagarosiphon	UE/FR	IA1i	IA1i	
<i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>argentatum</i> (Smejkal) J.Duvign	137071	Lamier jaune à feuilles argentées		IP5		Ajout
<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M.Bieb.) Hayek, 1931	137097	Lapsane intermédiaire		AS5		Ajout
<i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753	105211	Gesse à larges feuilles		IA1i	IA1e	Modification
<i>Laurus nobilis</i> L., 1753	105295	Laurier-sauce		IA1i	IA1e	Modification
<i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816	105433	Lentille d'eau minuscule		IA1i	IA1i	
<i>Lemna turionifera</i> Landolt, 1975	105442	Lentille d'eau turionifère		AS5	AS5	
<i>Lepidium didymum</i> L., 1767	105615	Gunnéra du Chili		NI	AS5	Suppression
<i>Lepidium draba</i> L., 1753, cité <i>Cardaria draba</i> (L.) Desv. dan	105621	Cadrave		AS2	AS5	Modification
<i>Leycesteria formosa</i> Wall., 1824	105869	Arbre à faisans		AS6	AS3	Modification
<i>Limnobiium laevigatum</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine, 19	729219	Grenouillette		IP4		Ajout
<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell, 1935	106252	Lindernie douteuse		IA1e	IP5	Modification
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv., 1815	106439	Alysson maritime		IP5	IP5	
<i>Lonicera japonica</i> Thunb., 1784	106571	Chèvrefeuille du Japon		IP5	AS6	Modification
<i>Lonicera ligustrina</i> var. <i>yunnanensis</i> Franch., 1896, (= <i>Loni</i>	998125	Chèvrefeuille arbustif		IP5		Ajout
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987, cité	106742	Jussie à grandes fleurs	UE/FR	IA1/3i	IA1/3i	
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1964	106748	Jussie faux-pourpier	UE/FR	IA1/3i	IA1/3i	

<i>Lycium barbarum</i> L., 1753	106965	Lyciet de barbarie		AS6	AS5	Modification
<i>Medicago arborea</i> L., 1753	107575	Luzerne arborescente		AS5		Ajout
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn., 1791	107739	Luzerne tronquée		AS5		Ajout
<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson, 1855	108642	Roseau de chine		AS6	AS6	
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc., 1973	109141	Myriophylle du brésil	UE/FR	IA1/3i	IA1/3i	
<i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth, 1990	161809	Aristelle très ténue		AS6	AS6	
<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli, 1875, cité <i>Oenothera erythraea</i>	109926	Onagre de Lamarck		AS2	AS6	Modification
<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton, 1789	109956	Onagre rosée		AS5		Ajout
<i>Oenothera x fallax</i> Renner, 1917	109980	Onagre trompeuse		AS2		Ajout
<i>Oloptum miliaceum</i> (L.) Röser & Hamasha, 2012	717338	Faux millet		AS5		Ajout
<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl., 1943	111823	Météorine d'Ecklon		AS2		Ajout
<i>Oxalis latifolia</i> Kunth, 1822	111897	Oxalis à feuilles larges		AS2		Ajout
<i>Oxalis pes-caprae</i> L., 1753	111910	Oxalis pied-de-chèvre		AS5		Ajout
<i>Panicum barbipulvinatum</i> Nash, 1900	112100	Panic d'Occident		DD		
<i>Panicum capillare</i> L., 1753	112111	Panic capillaire		DD		
<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx., 1803	112130	Millet dichotome		AS2	AS6	Modification
<i>Panicum miliaceum</i> subsp. <i>agricola</i> Scholz & Mikoláš, 1991	138541	Panic agricole		DD		
<i>Paronychia argentea</i> Lam., 1779	112429	Paronyque argentée		AS2		Ajout
<i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch, 1922	112463	Vigne-vierge commune		IP5	IP5	
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir., 1804	112482	Paspale dilaté		IP2	AS6	Modification
<i>Paspalum distichum</i> L., 1759	112483	Paspale à deux épis		IP1		Ajout
<i>Paspalum paucispicatum</i> Vasey, 1893	621658	Paspale peu épineux		IP5		Ajout
<i>Passiflora caerulea</i> L., 1753	112536	Passiflore bleu		AS5		Ajout
<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>urens</i> (Req. ex Godr.) Čelak., 1875	138626	Panais brûlant		IP3		Ajout
<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud., 1841	112560	Paulownia impérial		IP2		Ajout
<i>Petasites hybridus</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	112783	Pétasite hybride		IP5	IP5	
<i>Petasites pyrenaicus</i> (L.) G.López, 1986, cité <i>Petasites fragrans</i>	112790	Pétasite odorant		IP5	IP5	
<i>Petrosedum thartii</i> (L.P.Hébert) Niederle, 2014	969572	Orpin dressé		DD		
<i>Phedimus spurius</i> (M.Bieb.) t Hart, 1995	610868	Orpin bâtard		AS5		Ajout
<i>Phytolacca americana</i> L., 1753	113418	Raisin d'amérique		IP3	AS5	Modification
<i>Pilosella aurantiaca</i> subsp. <i>aurantiaca</i> (L.) F.W.Schultz & S	718388	Piloselle orangée		AS6		Ajout
<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	113689	Pin maritime		IP5		Ajout
<i>Pistia stratiotes</i> L., 1753	447733	Laitue d'eau	FR	IP4	AS5	Modification

<i>Polypogon viridis</i> (Gouan) Breistr., 1966	115031	Polypogon vert		AS2		Ajout
<i>Pontederia cordata</i> L., 1753	115096	Pontédérie à feuilles cordées		AS6		Ajout
<i>Pontederia crassipes</i> Mart., 1823, cité <i>Eichhornia crassipes</i>	454932	Jacinthe d'eau		AS5	AS5	
<i>Populus alba</i> L., 1753	115110	Peuplier blanc		IP5		Ajout
<i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., 1852	115157	Peuplier Baumier		AS2		Ajout
<i>Populus x canadensis</i> Moench, 1785	115167	Peuplier du Canada		AS5		Ajout
<i>Populus x canescens</i> (Aiton) Sm., 1804	115168	Peuplier grisard		DD		
<i>Portulaca granulatostellulata</i> (Poelln.) Ricceri & Arrigoni, 20	717432	Pourpier granulo-étoilé		DD		
<i>Potentilla indica</i> (Andrews) Th.Wolf, 1904	115527	Fraisier des indes		AS5		Ajout
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., 1784	116053	Prunier myrobolan		AS5		Ajout
<i>Prunus cerasus</i> L., 1753	116054	Cerisier acide		AS5	AS5	
<i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753	116089	Laurier palme		IA1i	IA1 i	
<i>Prunus lusitanica</i> L., 1753	116093	Prunier du Portugal		AS6		Ajout
<i>Prunus serotina</i> Ehrh., 1784	116137	Cerisier noir		IP5	AS5	Modification
<i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Lam.) Spach, 1834	116289	Ptérocaryer du Caucase		AS2	AS5	Modification
<i>Pyracantha</i> sp., cité <i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem. dans la li	0	Buisson ardent		IP5	IP5	
<i>Quercus rubra</i> L., 1753	116762	Chêne rouge d'amérique		AS6		Ajout
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt., 1777	117503	Renouée du Japon		IA1i	IA1 i	
<i>Reynoutria sachalinensis</i> (F.Schmidt) Nakai, 1922	117505	Renouée de sakhaline		AS5	AS5	
<i>Reynoutria x bohemica</i> Chrtek & Chrtková, 1983	117507	Renouée de Bohême		IA1i	IA1 i	
<i>Rhododendron ponticum</i> L., 1762	117692	Rhododendron pontique		IA1i	IA1 i	
<i>Rhus typhina</i> L., 1756	117723	Sumac vinaigrier		AS6	AS5	Modification
<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	117860	Robinier faux-acacia		IA1i	IP5	Modification
<i>Rosa multiflora</i> Thunb., 1784	118353	Rosier multiflore		AS5		Ajout
<i>Rosa rugosa</i> Thunb., 1784	118477	Rosier rugueux		IA1i	IP5	Modification
<i>Rumex cuneifolius</i> Campd., 1819	119475	Oseille à feuilles cunéiformes		DD		
<i>Sagittaria latifolia</i> Willd., 1805	119854	Sagittaire à larges feuilles		AS5	AS5	
<i>Salpichroa organifolia</i> (Lam.) Baill., 1888	120582	Muguet des pampas		AS6	AS6	
<i>Scabiosa atropurpurea</i> L., 1753	121316	Scabieuse pourpre noir		AS6		Ajout
<i>Sedum cespitosum</i> (Cav.) DC., 1828	122136	Orpin gazonnant		AS2		Ajout
<i>Sedum pallidum</i> M.Bieb., 1808	1017961	Orpin pale		DD		
<i>Senecio inaequidens</i> DC., 1838	122630	Séneçon du cap		IA1i	IP2	Modification
<i>Setaria italica</i> subsp. <i>pynocoma</i> (Steud.) de Wet, 1981	141058	Setaire dense		DD		
<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguélen, 1987	123138	Sétaire à petites fleurs		AS6		Ajout

<i>Solanum chenopodioides</i> Lam., 1794	124025	Morelle faux chénopode		AS2		Ajout
<i>Solanum laciniatum</i> Aiton, 1789	124064	Morelle laciniée		AS2		Ajout
<i>Solidago canadensis</i> L., 1753	124164	Solidage du canada		AS5	AS5	
<i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789	124168	Solidage géant		AS5	AS5	
<i>Soliva sessilis</i> Ruiz & Pav., 1794	124214	Soliva à fruits ailés		AS2		Ajout
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers., 1805	124378	Sorgho d'Alep		AS6	AS2	Modification
<i>Spiraea japonica</i> Lf., 1782	124646	Spirée du Japon		AS5		Ajout
<i>Spiraea x billiardii</i> Hérincq, 1857	124682	Spirée de Billard		AS2		Ajout
<i>Sporobolus alterniflorus</i> (Loisel.) P.M.Peterson & Saarela, 2	1015861	Spartine à fleurs alternes		IA1i	IA1i	
<i>Sporobolus anglicus</i> (C.E.Hubb.) P.M.Peterson & Saarela, 20	1015862	Spartine d'Angleterre		IA1i*	IA1i *	
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810	124719	Sporobole tenace		IP5	AS5	Modification
<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F.Blake, 1914	125324	Symphorine blanche		DD	AS5	Suppression
<i>Symphyotrichum lanceolatum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995, cité	125330	Aster lancéolé		AS6	AS5	Modification
<i>Symphyotrichum novae-angliae</i> (L.) G.L.Nesom, 1995, cité As	125331	Aster de la nouvelle-Angleterre		AS6	AS6	
<i>Symphyotrichum novi-belgii</i> (L.) G.L.Nesom, 1995, cité Aster	448412	Aster de la nouvelle-Belgique		AS6	AS5	Modification
<i>Symphyotrichum squamatum</i> (Spreng.) G.L.Nesom, 1995, cité	125333	Aster écailleux		IP5	AS5	Modification
<i>Symphyotrichum x salignum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995, cité A	125337	Aster à feuilles de saule		AS6	AS5	Modification
<i>Symphytum bulbosum</i> K.F.Schimp., 1825	125343	Consoude à bulbe		NI	AS6	Suppression
<i>Syringa vulgaris</i> L., 1753	125391	Lilas		AS5		Ajout
<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze, 1891	125935	Epinard de nouvelle-zélande		IP5	AS5	Modification
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771 [nom. et typ. cons.]	126650	Tilleul à grandes feuilles		DD		
<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl., 1862	126933	Palmier de Chusan		AS5	AS5	
<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell., 1829	126954	Tradescantia de Rio		AS6		Ajout
<i>Tsuga heterophylla</i> (Raf.) Sarg., 1899	127896	Pruche de l'Ouest		DD		
<i>Verbena bonariensis</i> L., 1753	128748	Verveine de Buenos Aires		NI	AS5	Suppression
<i>Vinca major</i> L., 1753	129468	Grande pervenche		AS6		Ajout
<i>Wolffia columbiana</i> H.Karst., 1865	999530	Wolffie de Colombie		DD		
<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter, 2003	612629	Lampourde d'Italie		AS5		Ajout
<i>Yucca gloriosa</i> L., 1753	130584	Yucca superbe		IP5	IP5	
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng., 1826	130605	Richarde		AS5		Ajout

Commentaire
En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel, notamment en forêt (gérée par l'ONF).
En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé.
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel, très vigoureux en forêt de pente, certaines souches sont très violentes. S'échappe des plantations, notamment parcs de château etc...
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, comportement envahissant en milieu anthropisé. En expansion.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, taxon faisant des pieds isolés sans caractère envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, comportement envahissant en milieu anthropisé. Espèce réglementée sur le territoire français.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé.
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, comportement envahissant en milieu anthropisé.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, taxon faisant des pieds isolés sans caractère envahissant.
En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé et causant des problèmes graves à la santé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant mais causant des problèmes graves à la santé humaine (pollen).
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. A peine naturalisé en Bretagne, très peu de données. Taxon méconnu.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant. Espèce réglementée sur le territoire français.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel. Espèce formatrice : même si l'espèce n'est plus observée à un endroit, elle eutrophise le milieu à moyen/long termes (espèce fixatrice d'Azote)
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel. Espèce réglementée sur le territoire français et faisant office d'arrêté de lutte dans le Morbihan et en Ile-et-Vilaine.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, taxon faisant des pieds isolés sans caractère envahissant.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant observé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel, notamment en bord d'étang.
En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel : ponctuellement très envahissant sur de grandes surfaces sur étang à sec. Plante encore assez peu répandue, mais

Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé. En expansion.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé. Confusion possible avec <i>Brassica rapa</i> var <i>olerifeira</i> (Navette).
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, comportement envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel. Soucis de différenciation entre les différentes Griffes de sorcières.
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel. Soucis de différenciation entre les différentes Griffes de sorcières.
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel. Soucis de différenciation entre les différentes Griffes de sorcières.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel, notamment en milieu dunaire.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé.
En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé, notamment en bord de route. Taxon méconnu, sous-espèces rares
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé.
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel. Espèce réglementée sur le territoire français.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel. Soucis d'identification des <i>Cotoneaster</i> .
En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel. Inclus <i>Cotoneaster hjelmqvistii</i> . Soucis d'identification des <i>Cotoneaster</i> .
En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel. Soucis d'identification des <i>Cotoneaster</i> .
En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel. Soucis d'identification des <i>Cotoneaster</i> .
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé.
En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel. Augmentation des stations aux fur et à mesures des années. Espèce plutôt pionnière, exemple : en prairie, si arrêt
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel. Espèce réglementée sur le territoire français.
Taxon ayant présenté par le passé un caractère envahissant.
Invasive avérée ailleurs (aquitaine). En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel.
En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé. (2 données depuis 2016, accidentelle).
Invasive avérée ailleurs en climat similaire, mais soucis d'identification. En Bretagne, 1 donnée en Morbihan en bord de champs sans information sur le comportement.

Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé.
En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé et causant des problèmes graves à la santé. C'est la forme var. stramonium qui est envahissante. La forme var.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel, fait des buissons (lianescent) sur les fourrés littoraux.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel, notamment sur l'Etang de Chatillon et très impactant pour le milieu.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel et causant des préjudices à certaines activités économiques.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel, notamment en milieu dunaire où l'espèce forme parfois des massifs denses. Propagée par les oiseaux c
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. Taxon ayant présenté par le passé un caractère envahissant en Bretagne (AS4 sur la liste de 2016). En 2023, elle est de nouveau occasionnellement observée comi
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel. De plus en plus de données, toujours en expansion. Espèce réglementée sur le territoire français.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, taxon faisant des pieds isolés sans caractère envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, taxon faisant des pieds isolés sans caractère envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé (pionnier) et tendance en milieu naturel (en dunes notamment).
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. Uniquement en milieu fortement anthropisé, que ce soit dans la région ou ailleurs dans le monde.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. Uniquement en milieu fortement anthropisé, que ce soit dans la région ou ailleurs dans le monde.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. Uniquement en milieu fortement anthropisé, que ce soit dans la région ou ailleurs dans le monde.

Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé et causant des problèmes graves à la santé. Espèce réglementée sur le territoire français.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel, notamment en milieu dunaire.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en lisière forestière à proximité de zone anthropisée où elle est plantée. Taxon à étudier et impact à analyser (tenderait à remplacer /
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel. Toujours peu de données en Bretagne, mais taxon en expansion qui pourrait encore "exploser" dans les années à venir. Espèce réglementée sur le t
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un caractère envahissant en milieu naturel. Présent dans le marais du Quellen (ENS 22) et très impactant pour le n
En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel, notamment en bord de Rance.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel. Espèce réglementée sur le territoire français.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel.
Taxon ayant présenté par le passé un caractère envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant essentiellement en milieu anthropisé et tendance en milieu naturel en lisière. Espèce réglementée sur le territoire français.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel. Espèce réglementée sur le territoire français.
En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel, notamment en boisement.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel, notamment en milieux dunaires.
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel envahissant, bien installé, notamment en dune, pelouse littorale, falaise, landes littorales.
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, données non spontanées.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, comportement envahissant observé en milieu naturel. Considérée accidentelles pour le moment (2 données en 35 depuis 2021).
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, en expansion sur les grèves d'étang, mais envahissant que sur quelques stations (Chatillon et Martigné-Ferchaud), où il impacte fortement le milie
En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel, notamment en milieu dunaire.
Pas invasive ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel, notamment dans certains fonds de vallons.
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel et causant des préjudices à certaines activités économiques. Espèce réglementée sur le territoire français.
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel et causant des préjudices à certaines activités économiques. Espèce réglementée sur le territoire français.

Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé.
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel et causant des préjudices à certaines activités économiques. Espèce réglementée sur le territoire français.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. Soucis d'identification taxonomique. En Bretagne, peu de données, une en bord d'étang, pas d'information sur leur comportement.
Soucis d'identification taxonomique. . Aucune source n'est en mesure de confirmer que c'est bien <i>P. capillare</i> sens strict et non <i>P. barbipulvinatum</i> , voire <i>hillmanii</i> qui est invasive sur les autres listes consi
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé.
Taxon méconnu. Données insuffisantes sur les dégâts aux cultures.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé.
En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, comportement envahissant en milieu anthropisé, notamment en bord de route.
Pas présent en Bretagne, mais invasive avérée sur la liste 2024 des Pays de la Loire et présent en Loire-Atlantique (département limitrophe).
Invasive avérée en Pays de la Loire. En Bretagne, tendance au développement d'un caractère envahissant en milieu naturel, notamment en grève d'étang sur quelques sites en Bretagne. Peu de stations (3 stat
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé et causant des problèmes graves à la santé. Risque sanitaire associé à la sève photosensibilisante. Taxon d'aff
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, espèce présente depuis peu sur le territoire. Comportement envahissant observé en milieu anthropisé.
En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel. Stations bretonnes issues d'échappées de jardin.
En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. Soucis d'identification. Confusion avec <i>P. reflexum</i> . En Bretagne, pas d'information sur le comportement, mais semble en expansion dans la région, notamm
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé et causant des problèmes graves à la santé. En expansion sur le te
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé.
En Bretagne, espèce très présente car beaucoup plantée, se ressemant activement à proximité des individus plantés avec une tendance à envahir les milieux naturels à proximité, notamment en landes.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, comportement envahissant observé en milieu naturel. Espèce accidentelle pour le moment, mais de plus en plus signalée à la faveur des introductio

Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel, en milieu dunaire notamment.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, semble en expansion sur le territoire. Pas d'infos sur le comportement.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. Groupe <i>Portulaca oleracea</i> méconnu, sous-espèces rarement distinguées. En Bretagne, pas d'information sur le comportement.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel, notamment en forêt.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel, notamment dans les plantations avec tendance à envahir les milieux
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé.
Taxon méconnu : une espèce du genre <i>Pyracantha</i> montre une tendance au développement d'un comportement envahissant en milieux naturels en Bretagne, mais il ne s'agirait pas de l'espèce <i>Pyracantha</i> c
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance à être envahissant en milieu anthropisé.
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel.
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs (partout en France). En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel régulièrement observé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, comportement envahissant observé en milieu dunaire et semble en expansion sur le territoire.
Statut d'invasive avérée en zone atlantique donné par MULLER en 2004 (issu d'ABOUCA YA 1999), n'a jamais été confirmé par la suite. En Bretagne, très peu de données et pas d'informations sur le compor
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. Taxon méconnu, récemment mis en évidence (En Bretagne, 1 seules données dans le 56 dans un cimetière).
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, comportement envahissant depuis longtemps en milieu anthropisé, mais impactent également fortement les milieux dunaires.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. Taxon méconnu et trop peu cité en en Bretagne pour établir son impact potentiel notamment sur les cultures (seul milieu potentiellement envahi).
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé.

Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé. En expansion, échappée à proximité des habitations. Pleins de données sur le littoral, à proximité d'habitat n
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé. Station observée à proximité d'une dépression arrière-dunaire, mais sur des parkings et en bord de chemin et
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé.
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel.
En Bretagne, comportement envahissant en milieu naturel.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, comportement envahissant sur les bords de routes et tendance à se développer également dans les milieux naturels à proximité. Semble en expansio
Comportement invasif avéré ailleurs en climat similaire pas très documenté, fertilité incertaine. Problèmes taxonomiques (nombreux hybrides complexes susceptibles de se naturaliser).
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé. Confusion avec d'autres espèces proches.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé. Confusion avec d'autres espèces proches.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé. Confusion avec d'autres espèces proches.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel, notamment en grève d'étangs.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé. Confusion avec d'autres espèces proches.
Pas de source sur son comportement envahissant ailleurs en milieu naturel. En Bretagne, 25 données, toutes en Finistère, paraît être en milieu fortement anthropisé uniquement (bords de routes essentiel
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, envahissant en milieu anthropisé et tendance à envahissement en milieux naturels (en dune embryonnaires notamment).
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. Identité réelle et chorologie/indigénat à étudier. En Bretagne, pas d'information sur le comportement.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, espèce peu notée et peu identifiée par les botanistes, comme d'autres espèces de résineux plantés en Bretagne.
Pas invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, 134 données dont 131 depuis 2016, pas de comportement envahissant observé.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu anthropisé.
Importation interdite dans tout l'ouest de l'Australie, mais non citée invasive avérée en France ou ailleurs dans le monde en contexte climatique similaire, du fait d'un processus de naturalisation récent et d
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.
En Bretagne, tendance au développement d'un comportement envahissant en milieu naturel.
Invasive avérée ailleurs en climat similaire. En Bretagne, pas de comportement envahissant.