

GUIDE COMMUNAL DES ESSENCES VÉGÉTALES LOCALES

APPLICABLE À L'ENSEMBLE DES ZONES À URBANISER, AGRICOLES, NATURELLES ET URBAINES

PRÉAMBULE :

L'objectif du présent Guide Communal des Essences Végétales Locales, annexé au Règlement Écrit du Plan Local d'Urbanisme de la Ville de Publier, est d'orienter et d'assister les choix des porteurs de projets tant particuliers que professionnels quant à la flore adéquate à sélectionner dans le cadre d'aménagements paysagers.

En premier lieu, ce listing a été fondé d'après les conseils du Service des Espaces Verts de la mairie. En second lieu, il a été enrichi par les renseignements collectés par la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA), dorénavant renommée France Nature Environnement (FNE) Auvergne-Rhône-Alpes, fédération régionale des associations de protection de la nature et de l'environnement.

En outre l'intérêt esthétique (espèce végétale ornementale), les espèces végétales suggérées dans ce livret recèlent des avantages indéniables pour la préservation de la biodiversité (flore et faune) ainsi que pour la production et la consommation alimentaire humaine. Toutefois, il est recommandé de vérifier le potentiel allergène (notamment cutanée et respiratoire) de chaque proposition et le potentiel toxique (notamment cutané et digestif) de chaque suggestion avant de choisir les espèces et leurs emplacements au sein de la propriété privée.

Ce guide a été conçu selon 5 axes de réflexion :

- Le premier tableau expose les essences d'arbres dits à grand développement, soit ceux d'une hauteur comprise entre 7 et 20 mètres à l'âge adulte ;
- Le deuxième tableau présente les essences d'arbres dits à petit développement, soit ceux d'une hauteur comprise entre 2 et 7 mètres à l'âge adulte ;
- Le troisième tableau inventorie les essences d'arbustes pertinentes afin de planter des haies vives et locales en clôture, soit ceux d'une hauteur comprise entre 1 et 2 mètres à l'âge adulte ;
- Le quatrième tableau recense les essences de plantes grimpantes / rampantes ;
- Le cinquième tableau référence les essences végétales exotiques invasives.

Les genres et variétés de végétaux sont classés par ordre alphabétique dans chaque tableau.

Au regard de l'évolution constante des croisements en botanique et en horticulture, les familles, les genres ainsi que les variétés de chacune des espèces végétales arborescentes, arbustives et grimpantes / rampantes listées au sein des tableaux de présentation ci-dessous ne sont pas exhaustives. D'autres espèces et sous-espèces pourront être proposées en-dehors de celles spécifiées ci-après (notamment les nombreux cultivars existants et futurs), aux conditions que le porteur de projet s'assure au préalable que :

- Les besoins nécessaires à la santé et à la pérennité de la plante peuvent être satisfaits (dimensions, ampleurs, croissance, luminosité, composition des sols et caractéristiques climatiques...) ;
- Les origines de la famille, du genre et de l'espèce végétale choisie sont par principe indigènes ou du moins, non-invasives.

Il est fortement recommandé de solliciter les conseils d'un pépiniériste ou d'une jardinerie avant d'effectuer toute commande.

À titre informatif, les espèces végétales protégées au sein du Département de la Haute-Savoie est proposée sur le site internet officiel de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) – en vertu de l'arrêté du 04/12/1990, complétant la liste nationale des espèces animales et végétales protégées au titre de l'arrêté du 20/01/1982.

LEXIQUE :

Notions et termes classés par ordre alphabétique

- **CADUC / MARESCENT / PERSISTANT :**

Une espèce végétale est considérée comme étant à feuillage caduc lorsque les feuilles émergent au printemps et tombent en automne ; en opposition au feuillage persistant.

Une espèce végétale est considérée comme étant à feuillage marcescent lorsque les feuilles flétries subsistent jusqu'à la fin de la saison hivernale.

Une espèce végétale est considérée comme étant à feuillage persistant lorsque les feuilles subsistent tout le long de l'année ; en opposition au feuillage caduc.

- **CULTIVAR :**

Cette notion désigne une variété artificielle obtenue par hybridation, sélection ou mutation d'une espèce végétale, afin d'être cultivée.

- **ESPÈCE / FAMILLE / GENRE :**

En botanique et en horticulture, les espèces végétales sont classées via 3 échelons dégressifs selon leurs caractéristiques (gènes et traits) communes : famille, genre et variété.

- Famille : est précisé par le suffixe « *-acées* » en français et « *-eae* » en latin / en exemple : *Rosacée* ou *Rosaceae* ;
- Genre : est désigné par le second mot dont la première lettre est écrite en majuscule / en exemple : *Spirée* ou *Spiraea* ;
- Variété : est indiqué par le troisième terme rédigé uniquement en minuscule / en exemple : *dentelée* ou *arguta* ;
Soit en exemple : *Rosaceae Spiraea arguta* ou *Rosacée Spirée dentelée*.

- **EXOTIQUE / INDIGÈNE :**

Une espèce végétale est considérée comme étant exotique lorsqu'elle pousse, avec ou sans intentions ou interventions humaines, dans un territoire donné qui n'est pas celui d'origine.

Une espèce végétale est considérée comme étant indigène lorsqu'elle croît naturellement dans un espace donné, sans aucune intention ou intervention de l'homme.

- **INTÉRÊT :**

- Alimentaire : désigne les espèces végétales dont la production de baies, de fleurs, de fruits et de graines permet de nourrir tant la faune que les hommes.
- Faunistique : désigne les espèces végétales produisant des graines, des fruits et des baies nourrissant les animaux, dont surtout la petite faune. Cette nourriture est souvent impropre à la consommation humaine (digestion difficile voire intoxication). L'intérêt faunistique peut également indiquer un intérêt d'habitat pour les oiseaux, les insectes et les rongeurs ou encore, par la visite des insectes pollinisateurs afin d'assurer la reproduction des espèces végétales endémiques.
- Mellifère / nectarifère : désigne les espèces végétales performantes dans la production de nectar et de pollen, accessibles par les insectes pollinisateurs et mellifères.



- **PONDUS HYDROGENIUM (Ph) :**

Il s'agit de l'unité de mesure permettant d'identifier le taux d'acidité (de 0 à 6,99) ou d'alcalinité (de 7,01 à 14) d'un liquide ; la neutralité étant identifiée à 7 sur une échelle de 14.

ESSENCES ARBORESCENTES RECOMMANDÉES



ARBRES DITS DE GRAND DÉVELOPPEMENT / HAUTEUR À L'ÂGE ADULTE COMPRISE ENTRE 5 ET 30 MÈTRES

NOMS VERNACULAIRES / NOMS SCIENTIFIQUES	CARACTÉRISTIQUES		PHOTOGRAPHIES	
	Esthétiques	Climatiques		
Aulne blanchi <i>Betulaceae</i> <i>Alnus incana</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou isolé - Croissance : rapide - Maturité : 20 mètres de hauteur, 12 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert gris - Floraison : printemps / fleur jaune	- Rusticité : -40° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, calcaire - Humidité : sol sec à humide - Ph : neutre à alcalin		
Aulne glutineux <i>Betulaceae</i> <i>Alnus glutinosa</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : isolé ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 25 mètres de hauteur, 12 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur jaune	- Rusticité : de -34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à alcalin		
Bouleau blanc <i>Betulaceae</i> <i>Betula alba</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : isolé - Croissance : rapide - Maturité : 20 mètres de hauteur, 12 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à jaune - Floraison : printemps / fleur jaune	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, caillouteux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à alcalin		
Bouleau pubescent <i>Betulaceae</i> <i>Betula pubescens</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : isolé - Croissance : rapide - Maturité : 20 mètres de hauteur, 10 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur jaune	- Rusticité : -9° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argileux, argilo-limoneux, caillouteux, sableux, tourbeux - Humidité : sol très sec à très humide - Ph : acide à alcalin		

Cèdre de l'Atlas <i>Pinaceae</i> <i>Cedrus atlantica</i> INTÉRÊT FAUNISTIQUE	- Usage : isolé - Croissance : lente - Maturité : 20 mètres de hauteur, 10 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert gris à vert bleu - Floraison : /	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin	 
Cèdre du Liban <i>Pinaceae</i> <i>Cedrus libani</i> INTÉRÊT FAUNISTIQUE	- Usage : isolé - Croissance : modérée - Maturité : 50 mètres de hauteur, 20 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : /	- Rusticité : -20° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin	 
Charme commun <i>Betulaceae</i> <i>Carpinus betulus</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou isolé - Croissance : lente - Maturité : 25 mètres de hauteur, 8 mètres de largeur - Feuillage : marcescent / vert - Floraison : printemps / fleur verte	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à ombragé - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à alcalin	 
Châtaignier commun <i>Fagaceae</i> <i>Castanea sativa</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE	- Usage : isolé - Croissance : modérée - Maturité : 20 mètres de hauteur, 15 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à jaune - Floraison : printemps / fleur jaune / fruit marron	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol humide - Ph : acide	 
Chêne pédonculé <i>Fagaceae</i> <i>Quercus robur</i> INTÉRÊT FAUNISTIQUE	- Usage : isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 10 mètres de hauteur, 3 mètres de largeur - Feuillage : marcescent / vert à orange - Floraison : printemps / fleur brune / fruit brun	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin	 

Chêne pubescent <i>Fagaceae</i> <i>Quercus pubescens</i> INTÉRÊT FAUNISTIQUE	- Usage : isolé - Croissance : lente - Maturité : 15 mètres de hauteur, 5 mètres de largeur - Feuillage : marcescent / vert à jaune - Floraison : printemps / fleur brune / fruit brun	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin	 
Chêne rouvre <i>Fagaceae</i> <i>Quercus petraea</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE	- Usage : isolé - Croissance : lente - Maturité : 30 mètres de hauteur, 18 mètres de largeur - Feuillage : marcescent / vert à orange - Floraison : printemps / fleur jaune / fruit brun	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, sableux - Humidité : sol sec à humide - Ph : acide à neutre	 
Liquidambar <i>Hamamelidaceae</i> <i>Liquidambar styraciflua</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : isolé ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 8 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à rouge - Floraison : printemps / fleur brune / fruit brun	- Rusticité : de -20 à -25° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argileux, argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à neutre	 
Épicéa commun <i>Pineaceae</i> <i>Picea abies</i> INTÉRÊT FAUNISTIQUE	- Usage : isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 35 mètres de hauteur, 15 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : /	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, calcaire - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à neutre	 
Érable champêtre <i>Sapindaceae</i> <i>Acer campestre</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 8 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à rouge - Floraison : printemps / fleur verte à jaune	- Rusticité : de -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, calcaire - Humidité : sol humide - Ph : neutre à alcalin	 


Érable de Freeman <i>Sapindaceae</i> <i>Acer x freemanii</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : isolé ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 15 mètres de hauteur, 12 mètres de largeur - Feuillage : caduc / verte à rouge - Floraison : printemps / fleur rouge	- Rusticité : - 34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : neutre	 
Hêtre commun <i>Fagaceae</i> <i>Fagus sylvatica</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou isolé - Croissance : modérée - Maturité : 20 mètres de hauteur, 15 mètres de largeur - Feuillage : marcescent / vert à orange - Floraison : printemps / fleur verte à jaune	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à humide - Ph : acide à alcalin	 
Laurier-tulipe ou Magnolia à grandes fleurs <i>Magnoliaceae</i> <i>Magnolia grandiflora</i>	- Usage : isolé ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 10 mètres de hauteur, 8 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : été / fleur blanche	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-limoneux, sableux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à alcalin	 
Noyer commun <i>Juglandaceae</i> <i>Juglans regia</i> INTÉRÊT FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE	- Usage : isolé ou verger - Croissance : lente - Maturité : 25 mètres de hauteur, 15 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche à verte / fruit marron	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : neutre à alcalin	 
Peuplier tremble <i>Salicaceae</i> <i>Populus tremula</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : isolé - Croissance : rapide - Maturité : 20 mètres de hauteur, 8 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-calcaire argilo-limoneux, - Humidité : sol frais à humide - Ph : neutre à alcalin	 

Pin des Alpes <i>Pinaceae</i> <i>Pinus cembra</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE	- Usage : isolé - Croissance : lente - Maturité : 25 mètres de hauteur, 5 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : printemps / fruit brun	- Rusticité : -18° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : tous les types de sol - Humidité : sol sec à humide - Ph : neutre	 
Pin noir <i>Pinaceae</i> <i>Pinus nigra</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE	- Usage : isolé ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 30 mètres de hauteur, 7 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert gris à vert bleu - Floraison : printemps / fruit brun	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : tous les types de sol - Humidité : sol sec à humide - Ph : neutre	 
Pin sylvestre <i>Pinaceae</i> <i>Pinus sylvestris</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE	- Usage : isolé ou massif - Croissance : lente - Maturité : de 20 à 25 mètres - Feuillage : persistant / vert bleu ou vert gris - Floraison : printemps / fruit brun	- Rusticité : -30° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol frais à sec - Ph : acide à neutre	 
Saule blanc <i>Salicaceae</i> <i>Salix alba</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : isolé - Croissance : rapide - Maturité : 20 mètres de hauteur, largeur 20 mètres - Feuillage : caduc / vert à jaune - Floraison : printemps / fleur verte à jaune	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol humide - Ph : acide à alcalin	 
Tilleul à grandes feuilles <i>Tiliaceae</i> <i>Tilia platyphyllos</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : isolé ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 35 mètres de hauteur, 15 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à jaune - Floraison : été / fleur jaune / fruit gris	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à alcalin	 



Tilleul à petites feuilles <i>Tiliaceae</i> <i>Tilia cordata</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou isolé - Croissance : modérée - Maturité : 25 mètres de hauteur, 15 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à jaune - Floraison : été / fleur jaune / fruit gris	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, glaiseux - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin	 
--	--	---	---

ESSENCES ARBORESCENTES RECOMMANDÉES

ARBRES DITS DE PETIT DÉVELOPPEMENT / HAUTEUR À L'ÂGE ADULTE COMPRISE ENTRE 2 ET 7 MÈTRES

NOMS VERNACULAIRES / NOMS SCIENTIFIQUES	CARACTÉRISTIQUES		PHOTOGRAPHIES	
	Esthétiques	Climatiques		
Gainier silicastre <i>Fabaceae</i> <i>Cercis siliquastrum</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE	- Usage : isolé ou massif - Croissance : lente - Maturité : 10 mètres de hauteur, 5 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à vert bleu - Floraison : printemps / fleur rose à violet / fruit rouge	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec - Ph : acide à basique		
Arbre à perruques <i>Anacardiaceae</i> <i>Cotinus coggygria</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 3 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert ou rouge - Floraison : été / fleur blanc à rose	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à basique		
Abricotier commun <i>Rosaceae</i> <i>Prunus armeniaca</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE	- Usage : isolé ou verger - Croissance : modérée - Maturité : 5 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à orangé - Floraison : printemps / fleur blanche à rose / fruit orange	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol sec à humide - Ph : neutre à alcalin		
Aubépine monogyne <i>Rosaceae</i> <i>Crateagus monogyna</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE	- Usage : haie ou isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 7 mètres de hauteur, 8 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche à rose / fruit rouge	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre à alcalin		

Aubépine épineuse <i>Rosaceae</i> <i>Crataegus oxyacantha</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE	- Usage : haie ou isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 6 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur rose / fruit rouge	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre à alcalin	 
Cityse des Alpes <i>Fabaceae</i> <i>Laburnum alpinum</i>	- Usage : isolé ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à jaune - Floraison : printemps / fleur jaune	- Rusticité : -20° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre à alcalin	 
Cerisier commun <i>Rosaceae</i> <i>Prunus avium</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE	- Usage : isolé ou verger - Croissance : rapide - Maturité : 5 mètres de hauteur, 3,5 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche / fruit rouge	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol sec à humide - Ph : acide à alcalin	 
Cerisier du Japon <i>Rosaceae</i> <i>Prunus serrulata</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE	- Usage : isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 6 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur rose	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol frais - Ph : acide à alcalin	 
Cornouiller mâle <i>Cornaceae</i> <i>Cornus mas</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE	- Usage : haie ou isolé ou massif ou talus - Croissance : modérée - Maturité : 4 mètres de hauteur et 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à jaune - Floraison : printemps / fleur jaune / fruit rouge	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre à alcalin	 

Cornouiller sanguin <i>Cornaceae</i> <i>Cornus sanguinea</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE	- Usage : haie ou isolé ou massif ou talus - Croissance : rapide - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à rouge - Floraison : printemps / fleur blanche	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à humide - Ph : acide à alcalin	 
Cyprès commun de Leyland <i>Cupressus cyparis leylandii</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE	- Usage : haie - Croissance : rapide - Maturité : 7 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : printemps / fruit brun	- Rusticité : -20° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais - Ph : acide à alcalin	 
Éléagne à étroites feuilles <i>Elaeagnaceae</i> <i>Elaeagnus angustifolia</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 3 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : automne / fleur blanche à jaune	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin	 
Érable du Japon <i>Sapindaceae</i> <i>Acer palmatum / Acer japonicum</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 6 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à rouge - Floraison : printemps / fleur rouge	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à ombragée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à neutre	 
Fusain d'Europe <i>Celastraceae</i> <i>Euonymus europaeus</i> INTÉRÊT FAUNISTIQUE	- Usage : haie ou isolé - Croissance : modérée - Maturité : 2,5 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur verte/ fruit rose à orange	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin	 

If commun <i>Taxus baccata</i> INTÉRÊT FAUNISTIQUE	- Usage : haie ou massif - Croissance : lente - Maturité : 3 mètres de hauteur, 1 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : printemps / fleur jaune / fruit rouge	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-limoneux, caillouteux - Humidité : sol sec à humide - Ph : alcalin	 
Lilas des Indes <i>Lythraceae</i> <i>Lagerstroemia Indica</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou isolé ou massif ou talus - Croissance : modérée - Maturité : 4 mètres de hauteur, 3 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à rouge - Floraison : été / fleur rose, violette, rouge	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à neutre	 
Magnolia de Soulange <i>Magnoliaceae</i> <i>Magnolia x Soulangeana</i>	- Usage : isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 6 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur rose	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à neutre	 
Mûrier blanc <i>Moraceae</i> <i>Morus alba</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE	- Usage : massif ou isolé ou verger - Croissance : modérée - Maturité : 7 mètres de hauteur, 6 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur jaune / fruit blanc à noir	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre	 
Mûrier noir <i>Moraceae</i> <i>Morus nigra</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE	- Usage : massif ou isolé ou verger - Croissance : modérée - Maturité : 7 mètres de hauteur, 13 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur jaune / fruit noir	- Rusticité : -20° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre	 


Noisetier commun <i>Betulaceae</i> <i>Coryllus avellana</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE	- Usage : isolé ou verger - Croissance : rapide - Maturité : 4 mètres de hauteur, 3 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à jaune - Floraison : printemps / fleur blanche à verte / fruit marron	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à humide - Ph : neutre à alcalin	 
Pêcher commun <i>Rosaceae</i> <i>Prunus persica</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE	- Usage : isolé ou verger - Croissance : lente - Maturité : 5 mètres de hauteur, 3 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps et été / fleur rose / fruit orange	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol sec à humide - Ph : neutre	 
Poirier commun <i>Rosaceae</i> <i>Pyrus communis</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE	- Usage : isolé ou verger - Croissance : modérée - Maturité : 7 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche / fruit jaune	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol humide - Ph : acide à neutre	 
Pommier commun <i>Rosaceae</i> <i>Malus domestica</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE	- Usage : isolé ou verger - Croissance : modérée - Maturité : 4 mètres de hauteur, 3,5 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche à rose / fruit vert à rouge	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, caillouteux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à alcalin	 
Pommier d'ornement <i>Rosaceae</i> <i>Malus perpetu</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE	- Usage : isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 5 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche à rose / fruit jaune à orange	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à alcalin	 

Pommier sauvage <i>Rosaceae</i> <i>Malus sylvestris</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE	- Usage : isolé ou verger - Croissance : modérée - Maturité : 7 mètres de hauteur, 5 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche à rose / fruit vert à orange	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais - Ph : acide à alcalin	 
Prunellier commun <i>Rosaceae</i> <i>Prunus spinosa</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE	- Usage : isolé ou verger - Croissance : rapide - Maturité : 3,5 mètres de hauteur, 3 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche / fruit bleu à noir	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin	 
Prunier commun <i>Rosaceae</i> <i>Prunus domestica</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE	- Usage : isolé ou verger - Croissance : modérée - Maturité : 7 mètres de hauteur, 5 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche / fruit vert à violet	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : humide - Ph : neutre	 
Saule marsault <i>Salicaceae</i> <i>Salix caprea</i> INTÉRÊT	- Usage : isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 6 mètres de hauteur, 3 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert gris - Floraison : printemps / fleur grise à vert	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol très sec à très humide - Ph : acide à alcalin	 
Saule pourpre <i>Salicaceae</i> <i>Salix purpurea</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / verte gris bleue - Floraison : printemps / fleur verte / fruit blanc	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol frais à humide - Ph : neutre à alcalin	 

Saule des vanniers <i>Salicaceae</i> <i>Salix viminalis</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 5 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur verte	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, calcaire - Humidité : sol humide à très humide - Ph : acide à alcalin	 
Sorbier des oiseaux <i>Rosaceae</i> <i>Sorbus aucuparia</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE	- Usage : isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 7 mètres de hauteur, 3,5 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : été / fleur blanche / fruit orange	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à alcalin	 
Sureau noir <i>Adoxaceae</i> <i>Sambucus nigra</i> INTÉRÊT FAUNISTIQUE	- Usage : haie ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 3,5 mètres de hauteur, 1 mètre de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : été / fleur blanche / fruit noir	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais - Ph : neutre à alcalin	 
Tamaris commun <i>Tamaricaceae</i> <i>Tamarix gallica</i>	- Usage : isolé ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 4 mètres de hauteur, 3 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur rose	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin	 
Tamaris de printemps <i>Tamaricaceae</i> <i>Tamarix parviflora</i>	- Usage : isolé ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 4,5 mètres de hauteur, 4,5 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur rose	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : caillouteux, calcaire - Humidité : sol frais - Ph : acide à alcalin	 


Troène commun <i>Oleaceae</i> <i>Ligustrum vulgare</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 4 mètres de hauteur, 2,5 mètres de largeur - Feuillage : marcescent / vert - Floraison : été / fleur blanche / fruit noir	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : neutre à alcalin		
--	---	--	--	--


ESSENCES ARBUSTIVES RECOMMANDÉES
HAUTEUR À L'ÂGE ADULTE COMPRISE ENTRE 1 ET 2 MÈTRES

NOMS VERNACULAIRES / NOMS SCIENTIFIQUES	CARACTÉRISTIQUES		PHOTOGRAPHIES	
	Esthétiques	Climatiques		
Abélie à grandes fleurs <i>Caprifoliaceae</i> <i>Abelia x grandiflora</i> INTÉRÊT FAUNISTIQUE	- Usage : haie ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 2 mètres de hauteur, 3,5 mètres de largeur - Feuillage : marcescent / vert - Floraison : été / fleur blanche à mauve	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin		
Hibiscus commun <i>Malvaceae</i> <i>Hibiscus syriacus</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou massif - Croissance : lente - Maturité : 2 mètres de hauteur, 1,5 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : été / fleur blanche à violet	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à humide - Ph : neutre à alcalin		
Aucuba du Japon <i>Cornaceae</i> <i>Aucuba japonicum</i>	- Usage : haie ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : printemps / fleur pourpre / fruit rouge	- Rusticité : -20° Celsius - Exposition : mi-ombragée à ombragée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre à alcalin		
Kolkwitzia <i>Caprifoliaceae</i> <i>Linnaea amabilis</i>	- Usage : haie ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2,5 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche à rose	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin		

Cassissier <i>Grossulariaceae</i> <i>Ribes nigrum</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE	- Usage : massif ou verger - Croissance : modérée - Maturité : 1 mètre de hauteur, 1,5 mètre de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : été / fleur vert / fruit noir	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à humide - Ph : acide à alcalin	 
Cornouiller blanc <i>Cornaceae</i> <i>Cornus alba</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 1,5 mètre de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à rouge - Floraison : printemps / fleur blanche à jaune / fruit blanc à bleu	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à alcalin	 
Cornouiller à bois jaune <i>Cornaceae</i> <i>Cornus stolonifera flaviramea</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à jaune - Floraison : printemps / fleur blanche	- Rusticité : -40° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argileux, argilo-limoneux - Humidité : sol frais à humide - Ph : acide à alcalin	 
Cotonéaster de Franchet <i>Rosaceae</i> <i>Cotoneaster franchetti</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 2,5 mètres de hauteur, 3,5 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : printemps / fleur blanche à rose / fruit rouge	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol frais - Ph : acide à alcalin	 
Cotonéaster laiteux <i>Rosaceae</i> <i>Cotoneaster lacteus</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 2 mètres de hauteur, 3 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : printemps / fleur blanche à rose / fruit rouge	- Rusticité : -20° Celsius - Exposition : ensoleillée à ombragée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin	 

Églantier <i>Rosaceae</i> <i>Rosa canina</i> INTÉRÊT FAUNISTIQUE	- Usage : haie ou massif ou talus - Croissance : rapide - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2,5 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : été / fleur blanche à rose / fruit rouge	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre à alcalin			
Cynorrhodon <i>Rosaceae</i> <i>Rosa rubiginosa</i> INTÉRÊT FAUNISTIQUE	- Usage : haie ou massif ou talus - Croissance : rapide - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : été / fleur rose / fruit rouge	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre à alcalin			
Deutzie effilé <i>Hydrangeaceae</i> <i>Deutzia gracilis</i> INTÉRÊT	- Usage : haie ou massif ou talus - Croissance : rapide - Maturité : 1 mètre de hauteur, 1 mètre de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre à alcalin			
Deutzie crénelé <i>Hydrangeaceae</i> <i>Deutzia crenata</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou massif ou talus - Croissance : rapide - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2,5 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : été / fleur blanche	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre à alcalin			
Éléagne à grandes feuilles <i>Elaeagnaceae</i> <i>Elaeagnus ebbingei</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 2 mètres de hauteur, 3 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : automne / fleur blanche à jaune	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin			

Mimosa de Paris <i>Oleaceae</i> <i>Forsythia</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur jaune	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à humide - Ph : acide à alcalin	 
Framboisier commun <i>Rosaceae</i> <i>Rubus idaeus</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE	- Usage : haie ou massif ou verger - Croissance : rapide - Maturité : 1 mètre de hauteur, 1 mètre de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : été / fleur jaune / fruit rose	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol humide - Ph : acide à alcalin	 
Groseillier commun <i>Grossulariaceae</i> <i>Ribes vulgare</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE	- Usage : haie ou massif ou verger - Croissance : modérée - Maturité : 1,5 mètre de hauteur, 1 mètre de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche / fruit rouge	- Rusticité : -34° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à humide - Ph : acide à neutre	 
Houx crénelé <i>Aquifoliaceae</i> <i>Ilex crenata</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE	- Usage : haie ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 1,5 mètre de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : printemps / fleur blanche à verte / fruit noir	- Rusticité : -18° Celsius - Exposition : mi-ombragée à ombragée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol frais - Ph : acide à neutre	 
Houx commun <i>Aquifoliaceae</i> <i>Ilex aquifolium</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE	- Usage : haie ou massif - Croissance : lente - Maturité : 2,5 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : printemps / fleur blanche à rose / fruit rouge	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, caillouteux - Humidité : sol frais - Ph : acide à alcalin	 

Seringat commun <i>Hydrangeaceae</i> <i>Philadelphus coronarius</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 2,5 mètres de hauteur, 2,5 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin			
Laurier cerise <i>Rosaceae</i> <i>Prunus laurocerasus</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE	- Usage : haie ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 1,5 mètre de hauteur, 1,5 mètre de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche / fruit noir	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, caillouteux - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre			
Lilas de Californie <i>Rhamnaceae</i> <i>Ceanothus</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 1 mètre de hauteur, 1 mètre de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : printemps / fleur bleue	- Rusticité : -10° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec - Ph : acide à alcalin			
Myrtillier commun <i>Ericaceae</i> <i>Vaccinium myrtillus</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE ET ALIMENTAIRE	- Usage : haie ou massif ou verger - Croissance : modérée - Maturité : 1,5 mètre de hauteur, 1,5 mètre de largeur - Feuillage : caduc / vert à rouge - Floraison : printemps / fleur blanche / fruit bleu	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux - Humidité : sol humide - Ph : acide			
Potentille arbustive <i>Rosaceae</i> <i>Dasiphora fruticosa</i>	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 1 mètre de hauteur, 1 mètre de largeur - Feuillage : caduc / vert à gris - Floraison : printemps / fleur jaune	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : alcalin			

Potentille blanche <i>Rosaceae</i> <i>Potentilla alba</i>	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 0,5 mètre de hauteur, 0,5 mètre de largeur - Feuillage : caduc / vert à gris - Floraison : printemps / fleur blanche	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol frais - Ph : neutre à alcalin	 
Oranger du Mexique <i>Rutaceae</i> <i>Choisya ternata</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : printemps / fleur blanche	- Rusticité : -15° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre	 
Cerisier de Nankin <i>Rosaceae</i> <i>Prunus tomentosa</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 1,5 mètre de hauteur, 1,5 mètre de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche à rose / fruit rouge	- Rusticité : -23° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-limoneux, caillouteux - Humidité : sol frais - Ph : acide à neutre	 
Spirée du Japon <i>Rosaceae</i> <i>Spiraea japonicum</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 1 mètre de hauteur, 1 mètre de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : été / fleur rose à rouge	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin	 
Spirée de Van Houtte <i>Rosaceae</i> <i>Spiraea x vanhouttei</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou massif - Croissance : rapide - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur blanche	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol sec à frais - Ph : acide à alcalin	 

Troène doré <i>Oleaceae</i> <i>Ligustrum ovalifolium aureum</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 1,5 mètre de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à jaune - Floraison : printemps / fleur blanche	- Rusticité : -18° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre à alcalin	 
Viorne lantane <i>Virburnum lantana</i>	- Usage : haie ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 2 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à gris - Floraison : printemps / fleur blanche / fruit rouge à noir	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argilo-calcaire, argilo-limoneux, calcaire - Humidité : sol sec à frais - Ph : neutre à alcalin	 
Weigélie fleurie <i>Caprifoliaceae</i> <i>Weigela florida</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou massif - Croissance : modérée - Maturité : 1,5 mètre de hauteur, 1,5 mètre de largeur - Feuillage : caduc / vert à jaune - Floraison : printemps / fleur rose à rouge	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais - Ph : neutre à alcalin	 

ESSENCES GRIMPANTES / RAMPANTES RECOMMANDÉES

NOMS VERNACULAIRES / NOMS SCIENTIFIQUES	CARACTÉRISTIQUES		PHOTOGRAPHIES	
	Esthétiques	Climatiques		
Chèvrefeuille des bois <i>Caprifoliaceae</i> <i>Lonicera xylosteum</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou support - Croissance : modérée - Maturité : 2,5 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à gris - Floraison : printemps / fleur blanche à jaune / fruit rouge	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais - Ph : acide à alcalin		
Chèvrefeuille des haies <i>Caprifoliaceae</i> <i>Lonicera periclymenum</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou support - Croissance : modérée - Maturité : 6 mètres de hauteur, 3 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert à gris - Floraison : printemps / fleur jaune à rose	- Rusticité : -20° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais - Ph : acide à alcalin		
Clématite vigne-blanche <i>Ranunculaceae</i> <i>Clematis vitalba</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE ET FAUNISTIQUE	- Usage : haie ou support - Croissance : modérée - Maturité : 6 mètres de hauteur, 3 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : été / fleur blanche à jaune / fruit gris	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais - Ph : acide à alcalin		
Glycine grimpante <i>Fabaceae</i> <i>Wisteria sinensis</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou support - Croissance : rapide - Maturité : 8 mètres de hauteur, 4 mètres de largeur - Feuillage : caduc / vert - Floraison : printemps / fleur violette	- Rusticité : -20° Celsius - Exposition : ensoleillée à mi-ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol frais - Ph : neutre		

Lierre grimpant <i>Araliaceae</i> <i>Hedera helix</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou support - Croissance : modérée - Maturité : 10 mètres de hauteur, 10 mètres de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : printemps / fleur verte / fruit bleu à noir	- Rusticité : -29° Celsius - Exposition : mi-ombragée à ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux, caillouteux, calcaire - Humidité : sol sec à humide - Ph : acide à alcalin	 
Passiflore bleue <i>Passifloraceae</i> <i>Passiflora caerulea</i> INTÉRÊT MELLIFÈRE	- Usage : haie ou support - Croissance : modérée - Maturité : 7 mètres de hauteur, 1 mètre de largeur - Feuillage : persistant / vert - Floraison : printemps / fleur blanche et bleue	- Rusticité : -10° Celsius - Exposition : ensoleillée à ombragée - Géologie : argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux - Humidité : sol humide - Ph : acide	 

ESSENCES VÉGÉTALES EXOTIQUES INVASIVES DANS LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

NOMS VERNACULAIRES / NOMS SCIENTIFIQUES	NUISANCES	PHOTOGRAPHIES	
ESPÈCES ARBORÉES			
Ailante <i>Simaroubaceae</i> <i>Ailanthus altissima</i>	Phénomène : Concurrence sur les espèces végétales indigènes pour leur développement Résultats : Diminution de la biodiversité tant floristique que faunistique Risque de peuplements végétaux monospécifiques		
Érable negundo <i>Sapindaceae</i> <i>Acer negundo</i>	Phénomène : Concurrence sur les espèces végétales indigènes pour leur développement Résultats : Diminution de la biodiversité tant floristique que faunistique Risque de peuplements végétaux monospécifiques Dégradation des forêts alluviales		
Robinier faux acacia <i>Fabaceae</i> <i>Robinia pseudo-acacia</i>	Phénomènes : Concurrence sur les espèces végétales indigènes pour leur développement Augmentation de l'apport en azote dans les sols alentours Résultats : Diminution de la biodiversité tant floristique que faunistique Risque de peuplements végétaux monospécifiques		
ESPÈCES ARBUSTIVES			
Faux indigo <i>Fabaceae</i> <i>Amorpha fruticosa</i>	Phénomènes : Concurrence sur les espèces végétales indigènes pour leur développement Augmentation de l'apport en azote dans les sols alentours Résultats : Diminution de la biodiversité tant floristique que faunistique Risque de peuplements végétaux monospécifiques		

Arbre aux papillons <i>Scrophulariaceae</i> <i>Buddleja davidii</i>	Phénomène : Concurrence sur les espèces végétales indigènes pour leur développement Résultat : Diminution de la biodiversité tant floristique que faunistique Risque de peuplements végétaux monospécifiques	
Sumac de Virginie <i>Anacardiaceae</i> <i>Rhus typhina</i>	Phénomènes : Concurrence sur les espèces végétales indigènes pour leur développement Présence d'éléments allergènes Résultats : Diminution de la biodiversité tant floristique que faunistique Risque de peuplements végétaux monospécifiques Éléments allergènes cutanés provoquant des dermatoses	
ESPÈCES GRIMPANTES / RAMPANTES		
Vigne vierge <i>Vitaceae</i> <i>Parthenocissus inserta</i>	Phénomène : Concurrence sur les espèces végétales indigènes pour leur développement Résultats : Diminution de la biodiversité tant floristique que faunistique Risque de peuplements végétaux monospécifiques	