

# DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET A L'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

## Aménagement de la RD6 entre Aizenay et Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Pièce M : Annexes du dossier DUP DAE / Annexe 2 : Annexes de l'étude  
écologique



| INDICE | DESCRIPTION       | ÉTABLI(E) | CONTRÔLÉ(E) | APPROUVÉ(E) | DATE       |
|--------|-------------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| V0     | Version initiale. | DPE       | BB          | BB          | 10/07/2025 |
|        |                   |           |             |             |            |

## **PIECES DU DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE**

Pièce A : Objets de l'enquête – Informations juridiques et administratives

Pièce B : Plan de situation

Pièce C : Notice explicative

Pièce D : Plan Général des Travaux

Pièce E Partie 1 : Introduction

Pièce E Partie 2 : Résumé non technique

Pièce E Partie 3 : Etat initial de l'environnement

Pièce E Partie 4 : Présentation du projet, solutions de substitution envisagées

Pièce E Partie 5 : Impacts du projet et mesures d'évitement, de réduction et de compensation associées, méthodes et auteurs de l'étude d'impact

Pièce F : Dossier de mise en compatibilité des documents d'urbanisme

Pièce G : Bilan de la concertation

Pièce H : Classement – Déclassement des voiries

Pièce I : Demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau

Pièce J : Dossier de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées (CNPN)

Pièce K : Résumé Non Technique du dossier DUP-DAE

Pièce L : Avis formulés sur le dossier DUP-DAE

**Pièce M : Annexes du dossier DUP-DAE**

**SOMMAIRE**

1 ANNEXE 2-1 : DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES DES DOCUMENTS D'ALERTE.....5

2 ANNEXE 2-2 : ARRÊTÉS DE PROTECTION NATIONALE OU RÉGIONALE .....11

3 ANNEXE 2-3 : CARTOGRAPHIE DES DOMAINES BIOGÉOGRAPHIQUES DE LA LISTE ROUGE DES ORTHOPTÈRES MENACÉS DE FRANCE (SARDET & DEFAUT, 2004).....12

4 ANNEXE 2-4 : LISTE DES ESPÈCES FLORISTIQUES OBSERVÉES SUR L'AIRE D'ÉTUDE .....13

5 ANNEXE 2-5 : LISTE DES ESPÈCES FAUNISTIQUES OBSERVÉES SUR L'AIRE D'ÉTUDE .....18

6 ANNEXE 2-6 : LISTE DES ESPÈCES D'OISEAUX RECENSÉES DANS LA BIBLIOGRAPHIE .....20

7 ANNEXE 2-7 : BIBLIOGRAPHIE.....22



# 1 ANNEXE 2-1 : DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES DES DOCUMENTS D'ALERTE

## Les ZNIEFF

L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) est réalisé à l'échelle régionale par des spécialistes dont le travail est validé par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) nommé par le préfet de région. Cet inventaire national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère chargé de l'Environnement constitue un outil de connaissance du patrimoine naturel de la France. Les données sont enfin transmises au Muséum National d'Histoire Naturelle pour évaluation et intégration au fichier national informatisé.

Les ZNIEFF correspondent à une portion de territoire particulièrement intéressante sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d'espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. Bien que l'inventaire ne constitue pas une mesure de protection juridique directe, ce classement implique sa prise en compte par les documents d'urbanisme et les études d'impact. En effet, les ZNIEFF indiquent la présence d'habitats naturels et identifient les espèces remarquables ou protégées par la loi. Il existe deux types de ZNIEFF :

- Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée, caractérisés par la présence d'espèces, d'association d'espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional.
- Les ZNIEFF de type II sont de vastes ensembles naturels riches et peu modifiés par l'Homme, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I.

## Les cours d'eau Liste 1

La Loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 a réformé les anciens classements des cours d'eau issus de la loi de 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et de l'article L432-6 du code de l'environnement pour donner une nouvelle dimension à ces outils réglementaires en lien avec les objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau, et en tout premier lieu l'atteinte ou le respect du bon état des eaux. Ainsi, deux listes de cours d'eau ont été établies et arrêtées pour chaque bassin hydrographique par le Préfet coordonnateur de bassin, en application de l'article L214.17 I du Code de l'environnement.

Le classement en liste 1 (1° du § 1 de l'article 214-17 du CE) vise à prévenir la dégradation et préserver la fonctionnalité de cours d'eau à forte valeur patrimoniale. Il empêche la construction de tout nouvel obstacle à la continuité écologique.

Il impose aussi la restauration de la continuité écologique à long terme, "au fur et à mesure des renouvellements d'autorisations ou de concessions, ou à l'occasion d'opportunités particulières". Ces opportunités peuvent être "des travaux, des modifications d'ouvrages, un renouvellement de contrat d'obligation d'achat ou des changements de circonstances de fait (connaissances nouvelles de suivis ou d'études, nouvelle espèce présente au niveau de l'ouvrage, etc.) qui peuvent justifier des prescriptions complémentaires".

Le classement en liste 1 conduit aussi à tenir compte de l'objectif de préservation "dans l'instruction de toute demande d'autorisation relative à d'autres activités humaines susceptibles d'impacter les cours d'eau concernés, notamment en matière d'hydrologie".

Ce classement est une évolution du classement en « rivières réservées » au titre de la loi de 1919.

### **Les Plans Nationaux d'Actions**

Le critère déterminant pour décider d'engager un plan national d'actions est le statut de l'espèce sur les listes rouges établies par l'UICN (d'autres critères sont utilisés comme les engagements européens/internationaux ou la responsabilité de la France). Il s'agit ensuite de mettre en place des actions en faveur des espèces menacées sélectionnées, répondant à des objectifs fixés. L'application est prévue pour une période de 5 ans en général (10 ans pour certains plans). La plupart des PNA identifient le besoin de protéger les principaux noyaux de populations par des statuts de protection, notamment réglementaires (APPB, RN, etc.).

A l'heure actuelle, ces délimitations n'ont pas de caractère réglementaire, mais sont à prendre en compte afin de ne pas réaliser d'action qui aille à l'encontre des objectifs et des actions fixés par le PNA sur ces périmètres.

### **Les périmètres Natura 2000**

La réglementation européenne repose essentiellement sur le Réseau Natura 2000 qui regroupe la Directive Oiseaux (du 2 avril 1979) et la Directive Habitats-Faune-Flore (du 21 mai 1992), transposées en droit français. Leur but est de préserver, maintenir ou rétablir, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire.

#### **➤ Zone de Protection Spéciale**

La Directive Oiseaux (CE 79/409) désigne un certain nombre d'espèces dont la conservation est jugée prioritaire au plan européen. Au niveau français, l'inventaire des Zones d'Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sert de base à la délimitation de sites appelés Zones de Protection Spéciale (ZPS) à l'intérieur desquelles sont contenues les unités fonctionnelles écologiques nécessaires au développement harmonieux de leurs populations : les « habitats d'espèces » (que l'on retrouvera dans la Directive Habitats). Ces habitats permettent d'assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages menacés de disparition, vulnérables à certaines modifications de leurs habitats ou considérés comme rares.

La protection des aires de reproduction, de mue, d'hivernage et des zones de relais de migration pour l'ensemble des espèces migratrices est primordiale, et comprend aussi bien des milieux terrestres que marins.

#### **➤ Zone Spéciale de Conservation / Site d'Intérêt Communautaire**

La Directive Habitats (CE 92/43) concerne le reste de la faune et de la flore. Elle repose sur une prise en compte non seulement d'espèces mais également de milieux naturels (les « habitats naturels », les éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages.), dont une liste figure en Annexe I de la Directive. Suite à la proposition de Site d'Intérêt Communautaire (pSIC) transmise par la France à l'U.E., elle conduit à l'établissement des Sites d'Intérêt Communautaire (SIC) qui permettent la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

### **Les Espaces Naturels Sensibles**

Institués par la loi du 31 décembre 1976, les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont régis par le Code de l'Urbanisme. L'Espace Naturel Sensible (ENS) est un site naturel qui présente un fort intérêt biologique et paysager. Il est fragile et souvent menacé et de ce fait doit être préservé.

Pour se faire, le Conseil Général/Départemental réalise leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les propriétaires privés ou publics. On distingue :

Les sites départementaux gérés et acquis par le Conseil Général/Départemental ;

Les sites locaux gérés par des communes, des communautés de communes ou des associations.

*« Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. (...) »*

### **Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope**

Pris par les préfets de département, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) se basent sur l'avis de la commission départementale des sites. Ils ont pour objectif, la protection des biotopes nécessaires à l'alimentation, la reproduction, le repos ou la survie des espèces animales ou végétales protégées par la loi.

Réglementé par le décret (n 77-1295) du 25 novembre 1977, pris pour l'application des mesures liées à la protection des espèces prévues par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : ces dispositions sont codifiées aux articles R. 411-15 à R. 411-17 et R. 415-1 du code de l'environnement. Il existe en outre une circulaire n 90-95 du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux espèces vivant dans les milieux aquatiques.

Les APPB ne comportent pas de mesures de gestion mais consistent essentiellement en une interdiction d'actions ou d'activités pouvant nuire à l'objectif de conservation du ou des biotope(s), et qui sont susceptibles d'être contrôlés par l'ensemble des services de police de l'Etat. Ils représentent donc des outils de protection forte, pouvant de plus être mobilisés rapidement (la procédure de création peut être courte durée s'il n'y a pas d'opposition manifeste).

### **Les Parcs Naturels Nationaux / Régionaux**

Réglementés par le Code de l'Environnement, et notamment par la Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux.

Placés sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature, les Parcs Naturels Nationaux français sont au nombre de 9. Classé par décret, un parc naturel national est généralement choisi lorsque *« la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, d'un milieu naturel présente un intérêt spécial et qu'il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution. »* (Chap. Ier, Article L331-1 du Code de l'Environnement). Tous les parcs nationaux assurent une mission de protection des espèces, des habitats et des ressources naturelles, une mission de connaissance, une mission de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. Enfin, ils participent au développement local et au développement durable.

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont pour objectif de protéger le patrimoine naturel et culturel remarquable d'espaces ruraux de qualité mais fragiles (Chap. III, Article L333-1 du Code de l'Environnement) Leur politique s'appuie sur la protection de l'environnement, l'aménagement du

territoire et son développement économique et social. La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et adoptée par décret portant classement en PNR pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du PNR.

### **Les Réserves Naturelles Nationales / Régionales**

Réglementés par le titre III du livre III « Espaces naturels » du Code de l'Environnement relatif aux parcs et réserves, et modifié notamment par la Loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010. Les réserves sont des outils réglementaires, de protection forte, correspondant à des zones de superficie limitée créées afin « *d'assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en œuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale* » (Art L332-2 du Code de l'Environnement).

Les Réserves Naturelles Nationales sont classées par décision du Ministre chargé de l'écologie et du développement durable. Elles sont créées par un décret (simple ou en Conseil d'Etat) qui précise les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions et modes d'occupation du sol qui y sont réglementés. Pour chaque réserve la réglementation est définie au cas par cas afin d'avoir des mesures de protection appropriées aux objectifs de conservation recherchés ainsi qu'aux activités humaines existantes sur chaque site.

En application de l'article L332-11 du Code de l'Environnement (modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 109 JORF 28 février 2002), les anciennes réserves naturelles volontaires sont devenues des Réserves Naturelles Régionales. Elles peuvent être créées à l'initiative des propriétaires des terrains eux-mêmes ou des conseils régionaux afin de protéger les espaces « *présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou d'une manière générale pour la protection des milieux naturels* » (art L332-2 du Code de l'Environnement). Le conseil régional fixe alors les limites de la réserve, les règles applicables, la durée du classement (reconductible tacitement) et désigne ensuite un gestionnaire avec lequel il passe une convention.

### **Les Réserves Nationales de Chasse et de Faune Sauvage**

Institué par la loi du 23 février 2005, c'est l'article L. 422-27 du code de l'environnement qui définit les Réserves Nationale de Chasse et de Faune Sauvage (RNCFS). Ces réserves ont pour vocation :

- De protéger les populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux ;
- D'assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ;
- De favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;
- De contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.

Elles sont créées à l'initiative d'un détenteur de droit de chasse ou d'une fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs. Ces réserves sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et de la Fédération nationale des chasseurs. Les conditions d'institution et de fonctionnement de ces réserves sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.



### **Les sites inscrits / sites classés**

La loi sur la protection des sites prévoit deux niveaux de protection, l'inscription et le classement. Ce dispositif est codifié par les articles L341-1 à L341-22 du Code de l'environnement. La mise en œuvre de cette législation relève de la responsabilité de l'Etat. Toutefois, la procédure peut être initiée par la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, des associations, des élus ou encore des propriétaires fonciers. Les sites inscrits et classés visent à préserver des lieux ayant un caractère exceptionnel d'un point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.

Les sites inscrits. L'inscription d'un site joue plus un rôle d'alerte auprès des pouvoirs publics. Des activités comme le camping, l'installation de village vacances ou la publicité sont interdites dans les agglomérations bénéficiant de cette mesure, sauf dérogation. Pour toute modification du site, les maîtres d'ouvrages ont l'obligation d'informer l'administration quatre mois au moins avant le début des travaux. L'Architecte des bâtiments de France émet un avis simple.

Les sites classés : Le classement est une protection plus forte que l'inscription, elle correspond à la volonté stricte de maintenir en l'état le site. Tous travaux susceptibles de modifier l'aspect ou l'état d'un site classé sont soumis à une autorisation spéciale (art. L. 341-10), délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit par le préfet, soit par le ministre chargé des sites après consultation de la commission départementale, préalablement à la délivrance des autorisations de droit commun.

### **Les Réserves de biosphère**

Les Réserves de biosphère sont le fruit du programme « Man and Biosphere » (MAB) initié par l'UNESCO en 1971 qui vise à instaurer des périmètres, à l'échelle mondiale, au sein desquels sont mises en place une conservation et une utilisation rationnelle de la biosphère.

Les Réserves de biosphère, désignées par les gouvernements nationaux, sont pensées comme étant des territoires d'application du programme MAB, qui consiste à « promouvoir un mode de développement économique et social, basé sur la conservation et la valorisation des ressources locales ainsi que sur la participation citoyenne ». La France compte un réseau de 10 réserves de biosphère, animé par le Comité MAB France, mais dont chacune reste placée sous la juridiction de l'Etat.

Les objectifs généraux de ces réserves sont triples : conserver la biodiversité (écosystèmes, espèces, gènes...), assurer un développement pour un avenir durable et mettre en place un réseau mondial de recherche et de surveillance continue de la biosphère.

Pour cela chacune d'elle est divisée en 3 secteurs : l'aire centrale dont la fonction est de protéger réglementairement la biodiversité locale, la zone tampon consacrée à l'application d'un mode de développement durable, et la zone de transition (ou coopération) où les restrictions sont moindres.

### **Les sites RAMSAR**

La convention de Ramsar sur les zones humides d'importance internationale du 2 février 1971 est relative aux zones humides d'importance internationale. Elle a pour objet de préserver les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que régulateur du régime des eaux et en tant qu'habitats d'une flore et d'une faune caractéristiques et, particulièrement, des oiseaux d'eau.

C'est le seul traité mondial du domaine de l'environnement qui porte sur un écosystème particulier et les pays membres de la Convention couvrent toutes les régions géographiques de la planète. Ainsi, au plan mondial, la convention a été ratifiée par 160 pays, et compte, en février 2012,

1 994 sites inscrits pour une superficie de 191,8 millions d'hectares. La France a ratifié la convention de Ramsar en 1986 avec la désignation d'un site (La Camargue). En 2012, la France avait désigné 38 sites d'une superficie totale de près de 3 315 695 ha, dont 30 sites en métropole et 8 sites en outre-mer. Ce sont actuellement les zones humides littorales, les plans d'eau et lagunes qui sont le mieux représentés parmi les sites désignés. Les deux derniers sites désignés l'ont été en février 2012.


La désignation d'un site constitue simplement un acte de labellisation et de reconnaissance par l'État. Celle-ci n'a donc aucun effet juridique.

## UNESCO

Les sites désignés au patrimoine mondial de l'UNESCO présentent un intérêt exceptionnel pour l'héritage commun de l'humanité. Ils sont actualisés annuellement par le comité du patrimoine mondial de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

## Schéma Régional de Cohérence Écologique

La loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement définit la notion et les objectifs de la trame Verte et Bleue. Cette trame vise à limiter la fragmentation des milieux et limiter l'isolement des populations animales et végétales dans des « réservoirs de biodiversité ». Ces réservoirs doivent être reliés les uns aux autres afin d'assurer un brassage génétique, permettre la migration de certaines espèces et favoriser le déplacement des animaux.



Les réservoirs de biodiversité peuvent être des habitats spécifiques (grotte pour les Chiroptères, forêt âgée pour des insectes xylophages) ou des zones d'alimentation ou bien des zones bénéficiant d'une protection légale.

Les corridors sont des axes de déplacement pour la faune et la flore. Ils peuvent être très variables : un cours d'eau (pour la faune aquatique), des alignements d'arbres (pour les chiroptères), une succession de mares (pour les amphibiens) ou encore des prairies (pour les grands mammifères).

Le bon fonctionnement d'un écosystème est dépendant des relations existantes entre les différents réservoirs de biodiversité qui le composent. Ces relations sont nécessaires au maintien des populations animales et végétales. Les aménagements (LGV, autoroute par exemple) et l'occupation des sols (agriculture, urbanisation...) humain peuvent nuire à ces échanges et conduire à l'isolement de certaines populations.

Ces corridors peuvent être interrompus par des aménagements : routes, barrages, zones urbanisées. Selon leur nature ces interruptions sont plus ou moins perméables et la fragmentation qu'ils induisent sera variable. Les espèces impactées sont également à prendre en compte, en fonction de leur capacité de dispersion, de leur mode de vie, de leur patrimonialité, etc.

## 2 ANNEXE 2-2 : ARRÊTÉS DE PROTECTION NATIONALE OU RÉGIONALE

### Flore

Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire.

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000000865328>

Arrêté du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Pays de la Loire complétant la liste nationale.

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000163158>

### Arthropodes

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500>

Arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones.

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000471000>

### Amphibiens et reptiles

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection.

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964>

### Mammifères (dont chiroptères)

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.


<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682>

### Oiseaux

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277>

### 3 ANNEXE 2-3 : CARTOGRAPHIE DES DOMAINES BIOGÉOGRAPHIQUES DE LA LISTE ROUGE DES ORTHOPTÈRES MENACÉS DE FRANCE (SARDET & DEFAUT, 2004)



## 4 ANNEXE 2-4 : LISTE DES ESPÈCES FLORISTIQUES OBSERVÉES SUR L'AIRE D'ÉTUDE

| Nom scientifique                                                      | Nom vernaculaire             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <i>Acacia dealbata</i> Link, 18224                                    | Mimosa argenté               |
| <i>Acer campestre</i> L., 1753                                        | Érable champêtre             |
| <i>Achillea millefolium</i> L., 1753                                  | Achillée millefeuille        |
| <i>Aesculus hippocastanum</i> L., 1753                                | Marronnier d'Inde            |
| <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753                                   | Aigremoine eupatoire         |
| <i>Agrostis canina</i> L., 1753                                       | Agrostide des chiens         |
| <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753                                   | Agrostide capillaire         |
| <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753                                  | Agrostide stolonifère        |
| <i>Aira caryophyllaea</i> L., 1753                                    | Canche caryophyllée          |
| <i>Aira praecox</i> L., 1753                                          | Canche printanière           |
| <i>Ajuga reptans</i> L., 1753                                         | Bugle rampant                |
| <i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796                                 | Plantain-d'eau lancéolé      |
| <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753                              | Plantain-d'eau               |
| <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913             | Alliaire                     |
| <i>Allium vineale</i> L., 1753                                        | Ail des vignes               |
| <i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Duby, 1828                             | Aulne de Corse               |
| <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790                             | Aulne glutineux              |
| <i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., 1799                               | Vulpin roux                  |
| <i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753                                | Vulpin genouillé             |
| <i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753                                  | Vulpin des prés              |
| <i>Amaranthus blitum</i> L., 1753                                     | Amarante livide              |
| <i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753                                | Amarante réfléchie           |
| <i>Anagallis arvensis</i> L., 1753                                    | Mouron des champs            |
| <i>Andryala integrifolia</i> L., 1753                                 | Andryale à feuilles entières |
| <i>Anisantha diandra</i> (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963                | Brome à deux étamines        |
| <i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934                           | Brome stérile                |
| <i>Anthemis cotula</i> L., 1753                                       | Camomille puante             |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753                                 | Flouve odorante              |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814                        | Cerfeuil sauvage             |
| <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842                         | Arabette de Thalius          |
| <i>Arctium lappa</i> L., 1753                                         | Grande bardane               |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | Fromental élevé              |
| <i>Artemisia annua</i> L., 1753                                       | Armoise annuelle             |
| <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753                                    | Armoise commune              |
| <i>Arum italicum</i> Mill., 1768                                      | Gouet d'Italie               |
| <i>Arum maculatum</i> L., 1753                                        | Gouet tacheté                |
| <i>Asphodelus albus</i> Mill., 1768                                   | Asphodèle blanc              |
| <i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753                               | Langue de cerf               |
| <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799                          | Fougère femelle              |
| <i>Atriplex patula</i> L., 1753                                       | Arroche étalée               |
| <i>Avena barbata</i> Pott ex Link, 1799                               | Avoine barbue                |

| Nom scientifique                                      | Nom vernaculaire            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Avena fatua</i> L., 1753                           | Folle-avoine                |
| <i>Bambusa</i> sp.                                    | Bambou sp.                  |
| <i>Bellis perennis</i> L., 1753                       | Pâquerette                  |
| <i>Betula pendula</i> Roth, 1788                      | Bouleau verruqueux          |
| <i>Bidens cernua</i> L., 1753                         | Bident penché               |
| <i>Bidens frondosa</i> L., 1753                       | Bident à fruits noirs       |
| <i>Bidens tripartita</i> L., 1753                     | Bident trifolié             |
| <i>Borago officinalis</i> L., 1753                    | Bourrache officinale        |
| <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | Brachypode des bois         |
| <i>Brassica napus</i> L., 1753                        | Colza                       |
| <i>Bromus catharticus</i> Vahl, 1791                  | Brome purgatif              |
| <i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753                     | Brome mou                   |
| <i>Bromus racemosus</i> L., 1762                      | Brome en grappe             |
| <i>Calendula officinalis</i> L., 1753                 | Souci officinal             |
| <i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772              | Callitriche des marais      |
| <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808               | Callune                     |
| <i>Campanula rapunculus</i> L., 1753                  | Campanule raiponce          |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792      | Capselle bourse-à-pasteur   |
| <i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796                 | Cardamine des bois          |
| <i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753                     | Cardamine hérissée          |
| <i>Cardamine impatiens</i> L., 1753                   | Cardamine impatiens         |
| <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753                   | Cardamine des prés          |
| <i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793               | Chardon à petites fleurs    |
| <i>Carex divisa</i> Huds., 1762                       | Laïche divisée              |
| <i>Carex elata</i> All., 1785                         | Laïche raide, Laïche élevée |
| <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771                     | Laïche glauque              |
| <i>Carex hirta</i> L., 1753                           | Laïche hérissée             |
| <i>Carex leersii</i> F.W.Schultz, 1870                | Laïche de Leers             |
| <i>Carex leporina</i> L., 1753                        | Laïche des lièvres          |
| <i>Carex pilulifera</i> L., 1753                      | Laïche à pilules            |
| <i>Carex remota</i> L., 1755                          | Laïche espacée              |
| <i>Carex riparia</i> Curtis, 1783                     | Laïche des rives            |
| <i>Carex vesicaria</i> L., 1753                       | Laïche vésiculeuse          |
| <i>Carpinus betulus</i> L., 1753                      | Charme                      |
| <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768                    | Châtaignier                 |
| <i>Centaurea nigra</i> L., 1753                       | Centauree noire             |
| <i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800                | Petite centaurée commune    |
| <i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816                | Céaiste commun              |
| <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799             | Céaiste aggloméré           |
| <i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753                | Cératophylle immergé        |
| <i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All., 1785             | Camomille romaine           |
| <i>Chenopodium album</i> L., 1753                     | Chénopode blanc             |



| Nom scientifique                                                       | Nom vernaculaire          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800                         | Cicendie filiforme        |
| <i>Circaea lutetiana</i> L., 1753                                      | Circée de Paris           |
| <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772                                | Cirse des champs          |
| <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768                               | Cirse d'Angleterre        |
| <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772                               | Cirse des marais          |
| <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838                               | Cirse commun              |
| <i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753                                    | Sariette commune          |
| <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886                            | Conopode dénudé           |
| <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753                                   | Liseron des champs        |
| <i>Convolvulus sepium</i> L., 1753                                     | Liseron des haies         |
| <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753                                       | Cornouiller sanguin       |
| <i>Corrigiola litoralis</i> L., 1753                                   | Corrigiole des grèves     |
| <i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 | Herbe de la Pampa         |
| <i>Corylus avellana</i> L., 1753                                       | Noisetier commun          |
| <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775                                  | Aubépine à un style       |
| <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840                             | Crépide capillaire        |
| <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852                                    | Gaillet croissette        |
| <i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) Schrad., 1806         | Crypsie faux-vulpin       |
| <i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) Schrad., 1806         | Crypside faux vulpin      |
| <i>Cyanus segetum</i> Hill, 1762                                       | Bleuet des moissons       |
| <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805                               | Chiendent pied-de-poule   |
| <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753                                    | Crételle                  |
| <i>Cyperus fuscus</i> L., 1753                                         | Souchet brun              |
| <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822                               | Genêt à balais            |
| <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753                                     | Dactyle aggloméré         |
| <i>Daucus carota</i> L., 1753                                          | Carotte sauvage           |
| <i>Dianthus armeria</i> L., 1753                                       | Œillet velu               |
| <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753                                     | Digitale pourpre          |
| <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771                          | Digitaire sanguine        |
| <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002                  | Herbe aux femmes battues  |
| <i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753                                      | Cabaret des oiseaux       |
| <i>Draba verna</i> L., 1753                                            | Drave de printemps        |
| <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959                  | Dryoptéris des chartreux  |
| <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848                       | Dryoptéris dilaté         |
| <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834                          | Fougère mâle              |
| <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812                      | Pied-de-coq               |
| <i>Echium vulgare</i> L., 1753                                         | Vipérine commune          |
| <i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC., 1808                           | Élatine à six étamines    |
| <i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818                        | Scirpe à nombreuses tiges |
| <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817                 | Scirpe des marais         |
| <i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934                     | Chiendent commun          |
| <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753                                     | Epilobe hérissé           |
| <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753                                   | Épilobe à tige carrée     |

| Nom scientifique                                              | Nom vernaculaire         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Equisetum arvense</i> L., 1753                             | Prêle des champs         |
| <i>Erica cinerea</i> L., 1753                                 | Bruyère cendrée          |
| <i>Erica scoparia</i> L., 1753                                | Bruyère à balais         |
| <i>Erigeron canadensis</i> L., 1753                           | Vergerette du Canada     |
| <i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz, 1852                        | Vesce hirsute            |
| <i>Ervum tetraspermum</i> L., 1753                            | Lentillon                |
| <i>Euonymus europaeus</i> L., 1753                            | Fusain d'Europe          |
| <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753                         | Eupatoire chanvrine      |
| <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753                        | Euphorbe des bois        |
| <i>Euphorbia peplus</i> L., 1753                              | Euphorbe des jardins     |
| <i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel, 1886                  | Cicendie naine           |
| <i>Ficaria verna</i> Huds., 1762                              | Renoncule ficaire        |
| <i>Ficaria verna</i> Huds., 1762                              | Ficaire fausse-renoncule |
| <i>Fragaria vesca</i> L., 1753                                | Fraisier sauvage         |
| <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753                            | Frêne élevé              |
| <i>Fumaria capreolata</i> Parl., 1844                         | Fumeterre de Bastard     |
| <i>Fumaria officinalis</i> L., 1753                           | Fumeterre officinale     |
| <i>Galium aparine</i> L., 1753                                | Gaillet gratteron        |
| <i>Galium mollugo</i> L., 1753                                | Gaillet commun           |
| <i>Galium palustre</i> L., 1753                               | Gaillet des marais       |
| <i>Galium verum</i> L., 1753                                  | Caille-lait jaune        |
| <i>Geranium columbinum</i> L., 1753                           | Géranium des colombes    |
| <i>Geranium dissectum</i> L., 1755                            | Géranium découpé         |
| <i>Geranium robertianum</i> L., 1753                          | Herbe à robert           |
| <i>Geranium sanguineum</i> L., 1753                           | Géranium sanguin         |
| <i>Geum urbanum</i> L., 1753                                  | Benoîte commune          |
| <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753                            | Lierre terrestre         |
| <i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859                         | Glycérie dentée          |
| <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810                     | Glycérie flottante       |
| <i>Gnaphalium luteoalbum</i> L., 1753                         | Gnaphale jaunâtre        |
| <i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753                         | Gnaphale des marais      |
| <i>Hedera helix</i> L., 1753                                  | Lierre grimpant          |
| <i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub, 1973              | Picride fausse Vipérine  |
| <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753                         | Berce commune            |
| <i>Hieracium umbellatum</i> L., 1753                          | Épervière en ombelle     |
| <i>Holcus lanatus</i> L., 1753                                | Houlque velue            |
| <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | Jacinthe des bois        |
| <i>Hypericum elodes</i> L., 1759                              | Millepertuis des marais  |
| <i>Hypericum humifusum</i> L., 1753                           | Millepertuis couché      |
| <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753                          | Millepertuis commun      |
| <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753                            | Millepertuis élégant     |
| <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753                          | Porcelle enracinée       |
| <i>Iris foetidissima</i> L., 1753                             | Iris fétide              |
| <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753                              | Iris faux acore          |
| <i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br., 1810                     | Scirpe flottant          |

| Nom scientifique                                                 | Nom vernaculaire          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810                         | Scirpe sétacé             |
| <i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791                           | Séneçon jacobée           |
| <i>Jasione montana</i> L., 1753                                  | Jasione des montagnes     |
| <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791                  | Jonc à tépales aigus      |
| <i>Juncus articulatus</i> L., 1753                               | Jonc à fruits luisants    |
| <i>Juncus bufonius</i> L., 1753                                  | Jonc des crapauds         |
| <i>Juncus bulbosus</i> L., 1753                                  | Jonc bulbeux              |
| <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753                             | Jonc aggloméré            |
| <i>Juncus effusus</i> L., 1753                                   | Jonc hétérophylle         |
| <i>Juncus effusus</i> L., 1753                                   | Jonc épars                |
| <i>Juncus inflexus</i> L., 1753                                  | Jonc glauque              |
| <i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f., 1782                       | Jonc des vasières         |
| <i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799                                | Jonc grêle                |
| <i>Juniperus communis</i> L., 1753                               | Genévrier commun          |
| <i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827                        | Linaire élatine           |
| <i>Lactuca serriola</i> L., 1756                                 | Laitue scariote           |
| <i>Lamium purpureum</i> L., 1753                                 | Lamier pourpre            |
| <i>Lapsana communis</i> L., 1753                                 | Lampsane commune          |
| <i>Lathraea clandestina</i> L., 1753                             | Lathrée clandestine       |
| <i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753                              | Gesse à larges feuilles   |
| <i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753                                | Gesse sans vrille         |
| <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753                               | Gesse des prés            |
| <i>Laurus nobilis</i> L., 1753                                   | Laurier-sauce             |
| <i>Lemna gibba</i> L., 1753                                      | Lentille d'eau bossue     |
| <i>Lemna minor</i> L., 1753                                      | Petite lentille d'eau     |
| <i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816                                  | Lentille d'eau minuscule  |
| <i>Leontodon saxatilis</i> Lam., 1779                            | Léontodon des rochers     |
| <i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br., 1812                       | Passerage des champs      |
| <i>Lepidium coronopus</i> L., 1753                               | Passerage écailleuse      |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779                           | Marguerite commune        |
| <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753                                | Troène commun             |
| <i>Limosella aquatica</i> L., 1753                               | Limoselle aquatique       |
| <i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768                           | Linaire striée            |
| <i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768                              | Linaire commune           |
| <i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell, 1935                        | Lindernie fausse-gratiote |
| <i>Linum bienne</i> Mill., 1768                                  | Lin bisannuel             |
| <i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | Chénopode polysperme      |
| <i>Lolium perenne</i> L., 1753                                   | Ray-grass commun          |
| <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753                            | Chèvrefeuille des bois    |
| <i>Lotus angustissimus</i> L., 1753                              | Lotier grêle              |
| <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753                               | Lotier corniculé          |
| <i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793                             | Lotier des marais         |
| <i>Lunaria annua</i> L., 1753                                    | Monnaie-du-Pape           |
| <i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805                          | Luzule champêtre          |
| <i>Luzula congesta</i> (Thuill.) Lej., 1811                      | Luzule ramassée           |
| <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811                      | Luzule multiflore         |

| Nom scientifique                                          | Nom vernaculaire                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753                       | Oeil-de-perdrix                  |
| <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753                         | Lycopce d'Europe                 |
| <i>Lysimachia minima</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009     | Centenille naine                 |
| <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753                     | Lysimaque nummulaire             |
| <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753                       | Lysimaque vulgaire               |
| <i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753                      | Salicaire à feuilles d'hyssoppe, |
| <i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967                | Pourpier d'eau                   |
| <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753                         | Salicaire commune                |
| <i>Matricaria chamomilla</i> L., 1753                     | Matricaire Camomille             |
| <i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838                     | Matricaire fausse-camomille      |
| <i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762                  | Luzerne tachetée                 |
| <i>Mentha aquatica</i> L., 1753                           | Menthe aquatique                 |
| <i>Mentha pulegium</i> L., 1753                           | Menthe pouliot                   |
| <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792                      | Menthe à feuilles rondes         |
| <i>Milium effusum</i> L., 1753                            | Millet des bois                  |
| <i>Montia fontana</i> L., 1753                            | Montie des fontaines             |
| <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764                  | Myosotis des champs              |
| <i>Myosotis laxa</i> Lehm., 1818                          | Myosotis lâche                   |
| <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753                      | Myosotis des marais              |
| <i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC., 1815               | Myriophylle à feuilles alternes  |
| <i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812              | Cresson des fontaines            |
| <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809                        | Nénuphar jaune                   |
| <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753                          | Oenanthe safranée                |
| <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819                  | Oenanthe à feuilles de Silaüs    |
| <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755                       | Orchis mâle                      |
| <i>Origanum vulgare</i> L., 1753                          | Origan                           |
| <i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753                    | Pied-d'oiseau délicat            |
| <i>Orobancha picridis</i> F.W.Schultz, 1830               | Orobanche de la picride          |
| <i>Panicum capillare</i> L., 1753                         | Panic capillaire                 |
| <i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx., 1803               | Millet glabre                    |
| <i>Papaver rhoeas</i> L., 1753                            | Coquelicot                       |
| <i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel, 1885            | Eufragie visqueuse               |
| <i>Paspalum dilatatum</i> Poir., 1804                     | Paspale dilaté                   |
| <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841             | Renouée poivre d'eau             |
| <i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre, 1800        | Renouée à feuilles de patience   |
| <i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821                     | Renouée Persicaire               |
| <i>Phleum pratense</i> L., 1753                           | Fléole des prés                  |
| <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840  | Roseau commun                    |
| <i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881                    | Épicéa commun                    |
| <i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 | Piloselle                        |
| <i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789                         | Pin maritime                     |
| <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753                          | Pin sylvestre                    |
| <i>Plantago coronopus</i> L., 1753                        | Plantain corne de cerf           |

| Nom scientifique                                             | Nom vernaculaire              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753                          | Plantain lancéolé             |
| <i>Plantago major</i> L., 1753                               | Plantain majeur               |
| <i>Poa annua</i> L., 1753                                    | Pâturin annuel                |
| <i>Poa trivialis</i> L., 1754                                | Pâturin commun                |
| <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753                            | Polygala commun               |
| <i>Polygonum aviculare</i> L., 1753                          | Renouée des oiseaux           |
| <i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961                   | Polypode intermédiaire        |
| <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799                 | Polystic à aiguillons         |
| <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913 | Polystic à soies              |
| <i>Populus alba</i> L., 1753                                 | Peuplier blanc                |
| <i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i> Du Roi, 1772        | Peuplier noir d'Italie        |
| <i>Populus tremula</i> L., 1753                              | Peuplier tremble              |
| <i>Portulaca oleracea</i> L., 1753                           | Pourpier cultivé              |
| <i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber, 1838                  | Potamot de Berchtold          |
| <i>Potamogeton crispus</i> L., 1753                          | Potamot crépu                 |
| <i>Potamogeton natans</i> L., 1753                           | Potamot nageant               |
| <i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788               | Potamot à feuilles de renouée |
| <i>Potamogeton pusillus</i> L., 1753                         | Potamot fluet                 |
| <i>Potentilla reptans</i> L., 1753                           | Potentille rampante           |
| <i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753                         | Petite pimprenelle            |
| <i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753                         | Petite pimprenelle            |
| <i>Primula vulgaris</i> Huds., 1762                          | Primevère acaule              |
| <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753                            | Brunelle commune              |
| <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755                            | Cerisier des oiseaux          |
| <i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753                          | Laurier-cerise                |
| <i>Prunus padus</i> L., 1753                                 | Cerisier à grappes            |
| <i>Prunus spinosa</i> L., 1753                               | Prunellier                    |
| <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879                   | Fougère-aigle                 |
| <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800               | Pulicaire dysentérique        |
| <i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau, 1857          | Pulmonaire à feuilles longues |
| <i>Quercus ilex</i> L., 1753                                 | Chêne vert                    |
| <i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl., 1784                  | Chêne sessile                 |
| <i>Quercus robur</i> L., 1753                                | Chêne pédonculé               |
| <i>Quercus rubra</i> L., 1753                                | Chêne rouge d'Amérique        |
| <i>Radiola linoides</i> Roth, 1788                           | Radiole faux-lin              |
| <i>Ranunculus acris</i> L., 1753                             | Renoncule âcre                |
| <i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753                         | Renoncule aquatique           |
| <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753                          | Renoncule bulbeuse            |
| <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753                          | Renoncule flammette           |
| <i>Ranunculus peltatus</i> Moench, 1794                      | Renoncule aquatique           |
| <i>Ranunculus repens</i> L., 1753                            | Renoncule rampante            |
| <i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763                       | Renoncule sarde               |
| <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753                        | Renoncule scélérate           |
| <i>Ranunculus tripartitus</i> DC., 1807                      | Renoncule tripartite          |
| <i>Raphanus raphanistrum</i> L., 1753                        | Ravenelle                     |

| Nom scientifique                                      | Nom vernaculaire            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753                  | Robinier faux-acacia        |
| <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821             | Rorippe amphibie            |
| <i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser, 1821            | Rorippe faux-cresson        |
| <i>Rosa canina</i> aggr.                              | Rosier sp.                  |
| <i>Rubia peregrina</i> L., 1753                       | Garance sauvage             |
| <i>Rubus</i> sp.                                      | Ronce sp.                   |
| <i>Rumex acetosa</i> L., 1753                         | Oseille sauvage             |
| <i>Rumex acetosella</i> L., 1753                      | Petite oseille              |
| <i>Rumex crispus</i> L., 1753                         | Oseille crépue              |
| <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753                    | Patience à feuilles obtuses |
| <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753                      | Fragon                      |
| <i>Sagina procumbens</i> L., 1753                     | Sagine couchée              |
| <i>Salix alba</i> L., 1753                            | Saule blanc                 |
| <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804                  | Saule à feuilles d'Olivier  |
| <i>Salix caprea</i> L., 1753                          | Saule marsault              |
| <i>Salix cinerea</i> L., 1753                         | Saule cendré                |
| <i>Salvia pratensis</i> L., 1753                      | Sauge des prés              |
| <i>Sambucus nigra</i> L., 1753                        | Sureau noir                 |
| <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753                    | Scorsonère des prés         |
| <i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753               | Scrofulaire aquatique       |
| <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753                   | Scrofulaire noueuse         |
| <i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762                  | Petite scutellaire          |
| <i>Sedum acre</i> L., 1753                            | Orpin acre                  |
| <i>Sedum album</i> L., 1753                           | Orpin blanc                 |
| <i>Senecio vulgaris</i> L., 1753                      | Séneçon vulgaire            |
| <i>Serratula tinctoria</i> L., 1753                   | Serratule des teinturiers   |
| <i>Sherardia arvensis</i> L., 1753                    | Rubéole des champs          |
| <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811               | Compagnon rouge             |
| <i>Silene latifolia</i> Gray, 1821                    | Compagnon blanc             |
| <i>Sison amomum</i> L., 1753                          | Sison                       |
| <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753                     | Morelle douce-amère         |
| <i>Solanum nigrum</i> L., 1753                        | Morelle noire               |
| <i>Solidago virgaurea</i> L., 1753                    | Solidage verge d'or         |
| <i>Sonchus arvensis</i> L., 1753                      | Laiteron des champs         |
| <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769                  | Laiteron rude               |
| <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1754                     | Laiteron piquant            |
| <i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753                      | Sorbier des oiseleurs       |
| <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763            | Alisier des bois            |
| <i>Sparganium erectum</i> L., 1753                    | Rubaniér dressé             |
| <i>Spergula arvensis</i> L., 1753                     | Spergule des champs         |
| <i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl, 1819 | Spergulaire rouge           |
| <i>Stachys arvensis</i> (L.) L., 1763                 | Épiaire des champs          |
| <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753                     | Épiaire des bois            |
| <i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767                   | Stellaire des sources       |
| <i>Stellaria graminea</i> L., 1753                    | Stellaire graminée          |
| <i>Stellaria holostea</i> L., 1753                    | Stellaire holostée          |

| Nom scientifique                                     | Nom vernaculaire                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789              | Mouron des oiseaux               |
| <i>Symphytum officinale</i> L., 1753                 | Grande consoude                  |
| <i>Taraxacum</i> sp.                                 | Pissenlit sp.                    |
| <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753                  | Sauge des bois                   |
| <i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771                | Tilleul à grandes feuilles       |
| <i>Trifolium campestre</i> C.C.Gmel., 1808           | Trèfle des champs                |
| <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794                 | Trèfle douteux                   |
| <i>Trifolium incarnatum</i> L., 1753                 | Trèfle incarnat                  |
| <i>Trifolium pratense</i> L., 1753                   | Trèfle des prés, Trèfle violet   |
| <i>Trifolium repens</i> L., 1753                     | Trèfle rampant,                  |
| <i>Trifolium squamosum</i> L., 1759                  | Trèfle écailleux                 |
| <i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753               | Trèfle souterrain                |
| <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip., 1844 | Matricaire inodore               |
| <i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf., 1840       | Carum verticillé                 |
| <i>Typha latifolia</i> L., 1753                      | Massette à larges feuilles       |
| <i>Ulex europaeus</i> L., 1753                       | Ajonc d'Europe                   |
| <i>Ulex minor</i> Roth, 1797                         | Ajonc nain                       |
| <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768                       | Orme champêtre                   |
| <i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948     | Nombril-de-Vénus                 |
| <i>Urtica dioica</i> L., 1753                        | Ortie dioïque                    |
| <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821       | Mâche                            |
| <i>Verbascum virgatum</i> Stokes, 1787               | Molène fausse-blattaire          |
| <i>Veronica arvensis</i> L., 1753                    | Véronique des champs             |
| <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753                  | Véronique des ruisseaux          |
| <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753                  | Véronique petit chêne            |
| <i>Veronica hederifolia</i> L., 1753                 | Véronique à feuilles de lierre   |
| <i>Veronica montana</i> L., 1755                     | Véronique des montagnes          |
| <i>Veronica officinalis</i> L., 1753                 | Véronique officinale             |
| <i>Veronica persica</i> Poir., 1808                  | Véronique de Perse               |
| <i>Veronica scutellata</i> L., 1753                  | Véronique à écus                 |
| <i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753               | Véronique à feuilles de serpolet |
| <i>Vicia bithynica</i> (L.) L., 1759                 | Vesce de Bithynie                |
| <i>Vicia cracca</i> L., 1753                         | Jarosse                          |
| <i>Vicia lathyroides</i> L., 1753                    | Vesce printanière                |
| <i>Vicia lutea</i> L., 1754                          | Vesce jaune                      |
| <i>Vicia segetalis</i> Thuill., 1799                 | Vesce des moissons               |
| <i>Vinca major</i> L., 1753                          | Grande pervenche                 |
| <i>Vinca minor</i> L., 1753                          | Petite pervenche                 |
| <i>Viola arvensis</i> Murray, 1770                   | Pensée des champs                |
| <i>Viola odorata</i> L., 1753                        | Violette odorante                |
| <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823                   | Violette de Rivinus              |
| <i>Viscum album</i> L., 1753                         | Gui des feuillus                 |
| <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821              | Vulpie queue-d'écureuil          |
| <i>Vulpia myuros</i> Rchb., 1830                     | Vulpie                           |

| Nom scientifique                                  | Nom vernaculaire           |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| <i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857 | Lentille d'eau sans racine |



5 ANNEXE 2-5 : LISTE DES ESPÈCES FAUNISTIQUES  
OBSERVÉES SUR L'AIRE D'ÉTUDE

| Groupe taxonomique |                           | Nom scientifique                  | Nom vernaculaire         |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Arthropodes        | Coléoptères saproxyliques | <i>Cerambyx cerdo</i>             | Grand Capricorne         |
|                    |                           | <i>Cerambyx scopolii</i>          | Petit Capricorne         |
|                    |                           | <i>Lucanus cervus</i>             | Lucane cerf-volant       |
|                    | Lépidoptères rhopalocères | <i>Aglais io</i>                  | Paon du jour             |
|                    |                           | <i>Anthocharis cardamines</i>     | Aurore                   |
|                    |                           | <i>Araschnia levana</i>           | Carte géographique       |
|                    |                           | <i>Aricia agestis</i>             | Collier-de-corail        |
|                    |                           | <i>Boloria dia</i>                | Petite Violette          |
|                    |                           | <i>Celastrina argiolus</i>        | Azuré des Nerpruns       |
|                    |                           | <i>Coenonympha pamphilus</i>      | Procris                  |
|                    |                           | <i>Colias crocea</i>              | Souci                    |
|                    |                           | <i>Cyaniris semiargus</i>         | Azuré des Anthyllides    |
|                    |                           | <i>Erynnis tages</i>              | Point de Hongrie         |
|                    |                           | <i>Lasiommata megera</i>          | Mégère                   |
|                    |                           | <i>Lycaena phlaeas</i>            | Cuivré commun            |
|                    |                           | <i>Lycaena tityrus</i>            | Cuivré fuligineux        |
|                    |                           | <i>Maniola jurtina</i>            | Myrtil                   |
|                    |                           | <i>Melitaea cinxia</i>            | Mélitée du Plantain      |
|                    |                           | <i>Nymphalis polychloros</i>      | Grande Tortue            |
|                    |                           | <i>Papilio machaon</i>            | Machaon                  |
|                    |                           | <i>Pararge aegeria</i>            | Tircis                   |
|                    |                           | <i>Pieris brassicae</i>           | Piéride du Chou          |
|                    |                           | <i>Pieris napi</i>                | Piéride du Navet         |
|                    |                           | <i>Pieris rapae</i>               | Piéride de la Rave       |
|                    |                           | <i>Polygonia c-album</i>          | Robert-le-diable         |
|                    |                           | <i>Polyommatus icarus</i>         | Azuré de la Bugrane      |
|                    |                           | <i>Thymelicus sylvestris</i>      | Hespérie de la Houque    |
|                    |                           | <i>Vanessa atalanta</i>           | Vulcain                  |
|                    |                           | <i>Vanessa cardui</i>             | Belle Dame               |
|                    |                           | <i>Zygaena filipendulae</i>       | Zygène de la Filipendule |
|                    | Orthoptères               | <i>Calliptamus italicus</i>       | Caloptène italien        |
|                    |                           | <i>Chorthippus albomarginatus</i> | Criquet marginé          |
|                    |                           | <i>Chorthippus dorsatus</i>       | Criquet verte-échine     |
|                    |                           | <i>Conocephalus fuscus</i>        | Conocéphale bigarré      |
|                    |                           | <i>Euchorthippus declivus</i>     | Criquet des Bromes       |
|                    |                           | <i>Gomphocerippus biguttulus</i>  | Criquet mélodieux        |
|                    |                           | <i>Gomphocerippus brunneus</i>    | Criquet duettiste        |
|                    |                           | <i>Gryllus campestris</i>         | Grillon champêtre        |
|                    |                           | <i>Leptophyes punctatissima</i>   | Leptophye ponctuée       |
|                    |                           | <i>Nemobius sylvestris</i>        | Grillon des bois         |
|                    |                           |                                   |                          |

| Groupe taxonomique |             | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire              |
|--------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Arthropodes        |             | <i>Oedipoda caerulea</i>            | Oedipode turquoise            |
|                    |             | <i>Omocestus rufipes</i>            | Criquet noir-ébène            |
|                    |             | <i>Phaneroptera falcata</i>         | Phanéroptère commun           |
|                    |             | <i>Phaneroptera nana</i>            | Phanéroptère méridional       |
|                    | Orthoptères | <i>Pholidoptera griseoaptera</i>    | Pholidoptère cendrée          |
|                    |             | <i>Platycleis affinis</i>           | Decticelle rudérale           |
|                    |             | <i>Pseudochorthippus parallelus</i> | Criquet des pâtures           |
|                    |             | <i>Pteronemobius heydenii</i>       | Grillon des marais            |
|                    |             | <i>Roesiliana roeselii</i>          | Decticelle bariolée           |
|                    |             | <i>Ruspolia nitidula</i>            | Conocéphale gracieux          |
|                    |             | <i>Tessellana tessellata</i>        | Decticelle carroyée           |
|                    |             | <i>Tetrix ceperoi</i>               | Tétrix des vasières           |
|                    |             | <i>Tetrix subulata</i>              | Tétrix riverain               |
|                    |             | <i>Tetrix undulata</i>              | Tétrix forestier              |
|                    |             | <i>Tettigonia viridissima</i>       | Grande Sauterelle verte       |
|                    |             | <i>Uromenus rugosicollis</i>        | Éphippigère carénée           |
|                    | Odonates    | <i>Aeshna cyanea</i>                | Aesche bleue                  |
|                    |             | <i>Anax imperator</i>               | Anax empereur                 |
|                    |             | <i>Calopteryx virgo</i>             | Calopteryx vierge             |
|                    |             | <i>Chalcolestes viridis</i>         | Leste vert                    |
|                    |             | <i>Coenagrion puella</i>            | Agrion jouvencelle            |
|                    |             | <i>Coenagrion mercuriale</i>        | Agrion de Mercure             |
|                    |             | <i>Cordulia aenea</i>               | Cordulie bronzée              |
|                    |             | <i>Enallagma cyathigerum</i>        | Agrion porte-coupe            |
|                    |             | <i>Erythronia lindenii</i>          | Agrion de Vander Linden       |
|                    |             | <i>Gomphus pulchellus</i>           | Gomphe joli                   |
|                    |             | <i>Ischnura elegans</i>             | Agrion élégant                |
|                    |             | <i>Ischnura pumilio</i>             | Agrion nain                   |
|                    |             | <i>Lestes barbarus</i>              | Leste sauvage                 |
|                    |             | <i>Lestes virens</i>                | Leste verdoyant               |
|                    |             | <i>Libellula depressa</i>           | Libellule déprimée            |
|                    |             | <i>Libellula fulva</i>              | Libellule fauve               |
|                    |             | <i>Libellula quadrimaculata</i>     | Libellule à quatre tâches     |
|                    |             | <i>Orthetrum cancellatum</i>        | Orthétrum réticulé            |
|                    |             | <i>Oxygastra curtisii</i>           | Cordulie à corps fin          |
|                    |             | <i>Platycnemis acutipennis</i>      | Agrion orangé                 |
|                    |             | <i>Pyrrhosoma nymphula</i>          | Petite nymphe au corps de feu |
|                    |             | <i>Sympetrum sanguineum</i>         | Sympétrum sanguin             |
|                    |             | <i>Sympetrum striolatum</i>         | Sympétrum fascié              |
|                    |             | <i>Sympetrum meridionale</i>        | Sympétrum méridional          |
| Amphibiens         |             | <i>Bufo bufo</i>                    | Crapaud épineux               |
|                    |             | <i>Hyla arborea</i>                 | Rainette verte                |
|                    |             | <i>Lissotriton helveticus</i>       | Triton palmé                  |
|                    |             | <i>Pelophylax kl. esculentus</i>    | Grenouille commune            |
|                    |             | <i>Pelophylax ridibundus</i>        | Grenouille rieuse             |



| Groupe taxonomique    | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire            |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                       | <i>Rana dalmatina</i>            | Grenouille agile            |
|                       | <i>Salamandra salamandra</i>     | Salamandre tachetée         |
|                       | <i>Triturus marmoratus</i>       | Triton marbré               |
| Reptiles              | <i>Anguis fragilis</i>           | Orvet fragile               |
|                       | <i>Lacerta bilineata</i>         | Lézard à deux raies         |
|                       |                                  |                             |
| Reptiles              | <i>Natrix helvetica</i>          | Couleuvre helvétique        |
|                       | <i>Podarcis muralis</i>          | Lézard des murailles        |
|                       | <i>Vipera aspis</i>              | Vipère aspic                |
| Mammifères terrestres | <i>Arvicola sapidus</i>          | Campagnol amphibie          |
|                       | <i>Capreolus capreolus</i>       | Chevreuil européen          |
|                       | <i>Clethrionomys glareolus</i>   | Campagnol roussâtre         |
|                       | <i>Erinaceus europaeus</i>       | Hérisson d'Europe           |
|                       | <i>Lepus europaeus</i>           | Lièvre d'Europe             |
|                       | <i>Meles meles</i>               | Blaireau d'Europe           |
|                       | <i>Micromys minutus</i>          | Rat des moissons            |
|                       | <i>Microtus agrestis</i>         | Campagnol agreste           |
|                       | <i>Myocastor coypus</i>          | <i>Ragondin</i>             |
|                       | <i>Ondatra zibethicus</i>        | <i>Rat musqué</i>           |
|                       | <i>Oryctolagus cuniculus</i>     | Lapin de garenne            |
|                       | <i>Rattus norvegicus</i>         | Rat surmulot                |
|                       | <i>Sciurus vulgaris</i>          | Ecureuil roux               |
|                       | <i>Sus scrofa</i>                | Sanglier                    |
|                       | <i>Talpa</i> sp.                 | Taupe indéterminée          |
|                       | <i>Vulpes vulpes</i>             | Renard roux                 |
|                       |                                  |                             |
|                       |                                  |                             |
| Chiroptères           | <i>Barbastella barbastellus</i>  | Barbastelle d'Europe        |
|                       | <i>Eptesicus serotinus</i>       | Sérotine commune            |
|                       | <i>Myotis daubentonii</i>        | Murin de Daubenton          |
|                       | <i>Myotis emarginatus</i>        | Murin à oreilles échancrées |
|                       | <i>Myotis mystacinus</i>         | Murin à moustache           |
|                       | <i>Myotis nattereri</i>          | Murin de Natterer           |
|                       | <i>Nyctalus leisleri</i>         | Noctule de Leisler          |
|                       | <i>Nyctalus noctula</i>          | Noctule commune             |
|                       | <i>Pipistrellus kuhlii</i>       | Pipistrelle de Kuhl         |
|                       | <i>Pipistrellus nathusii</i>     | Pipistrelle de Nathusius    |
|                       | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> | Pipistrelle commune         |
|                       | <i>Pipistrellus pygmaeus</i>     | Pipistrelle pygmée          |
|                       | <i>Plecotus auritus</i>          | Oreillard roux              |
|                       | <i>Plecotus austriacus</i>       | Oreillard gris              |
|                       | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | Grand Rhinolophe            |
|                       | <i>Rhinolophus hipposideros</i>  | Petit Rhinolophe            |
|                       |                                  |                             |
|                       |                                  |                             |
| Oiseaux               | <i>Accipiter nisus</i>           | Epervier d'Europe           |
|                       | <i>Actitis hypoleucos</i>        | Chevalier guignette         |
|                       | <i>Aegithalos caudatus</i>       | Orite à longue queue        |
|                       | <i>Alauda arvensis</i>           | Alouette des champs         |
|                       | <i>Alcedo atthis</i>             | Martin-pêcheur d'Europe     |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique                     | Nom vernaculaire          |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                    | <i>Alectoris rufa</i>                | Perdrix rouge             |
|                    | <i>Anas platyrhynchos</i>            | Canard colvert            |
|                    | <i>Anthus pratensis</i>              | Pipit farlouse            |
|                    | <i>Apus apus</i>                     | Martinet noir             |
|                    | <i>Ardea alba</i>                    | Grande Aigrette           |
|                    |                                      |                           |
| Oiseaux            | <i>Ardea cinerea</i>                 | Héron cendré              |
|                    | <i>Asio otus</i>                     | Hibou moyen-duc           |
|                    | <i>Bubulcus ibis</i>                 | Héron garde-bœufs         |
|                    | <i>Buteo buteo</i>                   | Buse variable             |
|                    | <i>Carduelis carduelis</i>           | Chardonneret élégant      |
|                    | <i>Certhia brachydactyla</i>         | Grimpereau des jardins    |
|                    | <i>Cettia cetti</i>                  | Bouscarle de Cetti        |
|                    | <i>Charadrius dubius</i>             | Petit Gravelot            |
|                    | <i>Chloris chloris</i>               | Verdier d'Europe          |
|                    | <i>Chroicocephalus ridibundus</i>    | Mouette rieuse            |
|                    | <i>Cisticola juncidis</i>            | Cisticole des joncs       |
|                    | <i>Columba livia forma domestica</i> | Pigeon biset (domestique) |
|                    | <i>Columba oenas</i>                 | Pigeon colombin           |
|                    | <i>Columba palumbus</i>              | Pigeon ramier             |
|                    | <i>Corvus corone</i>                 | Corneille noire           |
|                    | <i>Corvus frugilegus</i>             | Corbeau freux             |
|                    | <i>Corvus monedula</i>               | Choucas des tours         |
|                    | <i>Cuculus canorus</i>               | Coucou gris               |
|                    | <i>Cyanistes caeruleus</i>           | Mésange bleue             |
|                    | <i>Dendrocopos major</i>             | Pic épeiche               |
|                    | <i>Dryobates minor</i>               | Pic épeichette            |
|                    | <i>Egretta garzetta</i>              | Aigrette garzette         |
|                    | <i>Emberiza cirius</i>               | Bruant zizi               |
|                    | <i>Emberiza citrinella</i>           | Bruant jaune              |
|                    | <i>Erithacus rubecula</i>            | Rougegorge familier       |
|                    | <i>Falco tinnunculus</i>             | Faucon crécerelle         |
|                    | <i>Ficedula hypoleuca</i>            | Gobemouche noir           |
|                    | <i>Fringilla coelebs</i>             | Pinson des arbres         |
|                    | <i>Fringilla montifringilla</i>      | Pinson du nord            |
|                    | <i>Fulica atra</i>                   | Foulque macroule          |
|                    | <i>Gallinago gallinago</i>           | Bécassine des marais      |
|                    | <i>Gallinula chloropus</i>           | Gallinule poule-d'eau     |
|                    | <i>Garrulus glandarius</i>           | Geai des chênes           |
|                    | <i>Hippolais polyglotta</i>          | Hypolaïs polyglotte       |
|                    | <i>Hirundo rustica</i>               | Hirondelle rustique       |
|                    | <i>Larus argentatus</i>              | Goéland argenté           |
|                    | <i>Larus michahellis</i>             | Goéland leucophée         |
|                    | <i>Linaria cannabina</i>             | Linotte mélodieuse        |
|                    | <i>Lullula arborea</i>               | Alouette lulu             |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique               | Nom vernaculaire          |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                    | <i>Luscinia megarhynchos</i>   | Rossignol philomèle       |
|                    | <i>Motacilla alba</i>          | Bergeronnette grise       |
|                    | <i>Motacilla flava</i>         | Bergeronnette printanière |
|                    | <i>Muscicapa striata</i>       | Gobemouche gris           |
|                    | <i>Oenanthe oenanthe</i>       | Traquet motteux           |
|                    | <i>Oriolus oriolus</i>         | Loriot d'Europe           |
| Oiseaux            | <i>Parus major</i>             | Mésange charbonnière      |
|                    | <i>Passer domesticus</i>       | Moineau domestique        |
|                    | <i>Phasianus colchicus</i>     | Faisan de Colchide        |
|                    | <i>Phoenicurus ochruros</i>    | Rougequeue noir           |
|                    | <i>Phylloscopus collybita</i>  | Pouillot véloce           |
|                    | <i>Pica pica</i>               | Pie bavarde               |
|                    | <i>Picus viridis</i>           | Pic vert                  |
|                    | <i>Pluvialis apricaria</i>     | Pluvier doré              |
|                    | <i>Poecile palustris</i>       | Mésange nonnette          |
|                    | <i>Prunella modularis</i>      | Accenteur mouchet         |
|                    | <i>Regulus ignicapilla</i>     | Roitelet à triple bandeau |
|                    | <i>Regulus regulus</i>         | Roitelet huppé            |
|                    | <i>Saxicola rubicola</i>       | Tarier pâtre              |
|                    | <i>Scolopax rusticola</i>      | Bécasse des bois          |
|                    | <i>Serinus serinus</i>         | Serin cini                |
|                    | <i>Sitta europaea</i>          | Sittelle torchepot        |
|                    | <i>Spinus spinus</i>           | Tarin des aulnes          |
|                    | <i>Streptopelia decaocto</i>   | Tourterelle turque        |
|                    | <i>Streptopelia turtur</i>     | Tourterelle des bois      |
|                    | <i>Sturnus vulgaris</i>        | Étourneau sansonnet       |
|                    | <i>Sylvia atricapilla</i>      | Fauvette à tête noire     |
|                    | <i>Sylvia borin</i>            | Fauvette des jardins      |
|                    | <i>Sylvia communis</i>         | Fauvette grisette         |
|                    | <i>Tachybaptus ruficollis</i>  | Grèbe castagneux          |
|                    | <i>Tringa ochropus</i>         | Chevalier culblanc        |
|                    | <i>Troglodytes troglodytes</i> | Troglodyte mignon         |
|                    | <i>Turdus iliacus</i>          | Grive mauvis              |
|                    | <i>Turdus merula</i>           | Merle noir                |
|                    | <i>Turdus philomelos</i>       | Grive musicienne          |
|                    | <i>Turdus pilaris</i>          | Grive litorne             |
|                    | <i>Turdus viscivorus</i>       | Grive draine              |
|                    | <i>Tyto alba</i>               | Effraie des clochers      |
|                    | <i>Upupa epops</i>             | Huppe fasciée             |
|                    | <i>Vanellus vanellus</i>       | Vanneau huppé             |

6 ANNEXE 2-6 : LISTE DES ESPÈCES D'OISEAUX  
RECENSÉES DANS LA BIBLIOGRAPHIE

| Nom vernaculaire            | Nom scientifique              | Protection    |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Accenteur mouchet           | <i>Prunella modularis</i>     | PN (Art. 3)   |
| Aigrette garzette           | <i>Egretta garzetta</i>       | PN (Art. 3)   |
| Alouette des champs         | <i>Alauda arvensis</i>        | -             |
| Alouette lulu               | <i>Lullula arborea</i>        | PN (Art. 3)   |
| Autour des palombes         | <i>Accipiter gentilis</i>     | PN (Art. 3/6) |
| Avocette élégante           | <i>Recurvirostra avosetta</i> | PN (Art. 3)   |
| Balbuzard pêcheur           | <i>Pandion haliaetus</i>      | PN (Art. 3)   |
| Barge à queue noire         | <i>Limosa limosa</i>          | -             |
| Barge rousse                | <i>Limosa lapponica</i>       | -             |
| Bécasse des bois            | <i>Scolopax rusticola</i>     | -             |
| Bécasseau maubèche          | <i>Calidris canutus</i>       | -             |
| Bécasseau sanderling        | <i>Calidris alba</i>          | PN (Art. 3)   |
| Bécasseau variable          | <i>Calidris alpina</i>        | PN (Art. 3)   |
| Bécassine des marais        | <i>Gallinago gallinago</i>    | -             |
| Bécassine sourde            | <i>Lymnocyptes minimus</i>    | -             |
| Bec-croisé des sapins       | <i>Loxia curvirostra</i>      | PN (Art. 3)   |
| Bergeronnette des ruisseaux | <i>Motacilla cinerea</i>      | PN (Art. 3)   |
| Bergeronnette grise         | <i>Motacilla alba</i>         | PN (Art. 3)   |
| Bergeronnette printanière   | <i>Motacilla flava</i>        | PN (Art. 3)   |
| Bernache cravant            | <i>Branta bernicla</i>        | PN (Art. 3)   |
| Bernache nonette            | <i>Branta leucopsis</i>       | PN (Art. 3)   |
| Bihoreau gris               | <i>Nycticorax nycticorax</i>  | PN (Art. 3)   |
| Bondrée apivore             | <i>Pernis apivorus</i>        | PN (Art. 3)   |
| Bouscarle de Cetti          | <i>Cettia cetti</i>           | PN (Art. 3)   |
| Bouvreuil pivoine           | <i>Pyrrhula pyrrhula</i>      | PN (Art. 3)   |
| Bruant des roseaux          | <i>Emberiza schoeniclus</i>   | PN (Art. 3)   |
| Bruant jaune                | <i>Emberiza citrinella</i>    | PN (Art. 3)   |
| Bruant proyer               | <i>Emberiza calandra</i>      | PN (Art. 3)   |
| Bruant zizi                 | <i>Emberiza cirlus</i>        | PN (Art. 3)   |
| Busard cendré               | <i>Circus pygargus</i>        | PN (Art. 3)   |
| Busard des roseaux          | <i>Circus aeruginosus</i>     | PN (Art. 3)   |
| Busard Saint-Martin         | <i>Circus cyaneus</i>         | PN (Art. 3)   |
| Buse variable               | <i>Buteo buteo</i>            | PN (Art. 3)   |
| Caille des blés             | <i>Coturnix coturnix</i>      | -             |
| Canard chipeau              | <i>Anas strepera</i>          | -             |
| Canard colvert              | <i>Anas platyrhynchos</i>     | -             |
| Canard mandarin             | <i>Aix galericulata</i>       | -             |
| Canard pilet                | <i>Anas acuta</i>             | -             |
| Canard siffleur             | <i>Anas penelope</i>          | -             |
| Canard souchet              | <i>Anas clypeata</i>          | -             |
| Chardonneret élégant        | <i>Carduelis carduelis</i>    | PN (Art. 3)   |
| Chevalier aboyeur           | <i>Tringa nebularia</i>       | -             |
| Chevalier arlequin          | <i>Tringa erythropus</i>      | -             |
| Chevalier culblanc          | <i>Tringa ochropus</i>        | PN (Art. 3)   |
| Chevalier gambette          | <i>Tringa totanus</i>         | -             |
| Chevalier guignette         | <i>Actitis hypoleucos</i>     | PN (Art. 3)   |
| Chevalier sylvain           | <i>Tringa glareola</i>        | PN (Art. 3)   |
| Chevêche d'Athéna           | <i>Athene noctua</i>          | PN (Art. 3)   |
| Choucas des tours           | <i>Corvus monedula</i>        | PN (Art. 3)   |
| Chouette hulotte            | <i>Strix aluco</i>            | PN (Art. 3)   |

| Nom vernaculaire         | Nom scientifique              | Protection    |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| Cigogne blanche          | <i>Ciconia ciconia</i>        | PN (Art. 3)   |
| Cigogne noire            | <i>Ciconia nigra</i>          | PN (Art. 3)   |
| Circaète Jean-le-Blanc   | <i>Circaetus gallicus</i>     | PN (Art. 3)   |
| Cisticole des joncs      | <i>Cisticola juncidis</i>     | PN (Art. 3)   |
| Cochevis huppé           | <i>Galerida cristata</i>      | PN (Art. 3)   |
| Combattant varié         | <i>Calidris pugnax</i>        | -             |
| Corbeau freux            | <i>Corvus frugilegus</i>      | -             |
| Corneille noire          | <i>Corvus corone</i>          | -             |
| Coucou gris              | <i>Cuculus canorus</i>        | PN (Art. 3)   |
| Courlis cendré           | <i>Numenius arquata</i>       | -             |
| Courlis corlieu          | <i>Numenius phaeopus</i>      | -             |
| Cygne noir               | <i>Cygnus atratus</i>         | -             |
| Cygne tuberculé          | <i>Cygnus olor</i>            | PN (Art. 3)   |
| Échasse blanche          | <i>Himantopus himantopus</i>  | PN (Art. 3)   |
| Effraie des clochers     | <i>Tyto alba</i>              | PN (Art. 3)   |
| Élanion blanc            | <i>Elanus caeruleus</i>       | PN (Art. 3)   |
| Engoulevent d'Europe     | <i>Caprimulgus europaeus</i>  | PN (Art. 3)   |
| Épervier d'Europe        | <i>Accipiter nisus</i>        | PN (Art. 3/6) |
| Étourneau sansonnet      | <i>Sturnus vulgaris</i>       | -             |
| Faisan de Colchide       | <i>Phasianus colchicus</i>    | -             |
| Faucon crécerelle        | <i>Falco tinnunculus</i>      | PN (Art. 3)   |
| Faucon émerillon         | <i>Falco columbarius</i>      | PN (Art. 3)   |
| Faucon hobereau          | <i>Falco subbuteo</i>         | PN (Art. 3)   |
| Faucon kobez             | <i>Falco vespertinus</i>      | PN (Art. 3)   |
| Faucon pèlerin           | <i>Falco peregrinus</i>       | PN (Art. 3)   |
| Fauvette à tête noire    | <i>Sylvia atricapilla</i>     | PN (Art. 3)   |
| Fauvette babillarde      | <i>Sylvia curruca</i>         | PN (Art. 3)   |
| Fauvette des jardins     | <i>Sylvia borin</i>           | PN (Art. 3)   |
| Fauvette grisette        | <i>Sylvia communis</i>        | PN (Art. 3)   |
| Foulque macroule         | <i>Fulica atra</i>            | -             |
| Fuligule milouin         | <i>Aythya ferina</i>          | -             |
| Fuligule milouinan       | <i>Aythya marila</i>          | -             |
| Fuligule morillon        | <i>Aythya fuligula</i>        | -             |
| Gallinule poule-d'eau    | <i>Gallinula chloropus</i>    | -             |
| Geai des chênes          | <i>Garrulus glandarius</i>    | -             |
| Gobemouche à collier     | <i>Ficedula albicollis</i>    | PN (Art. 3)   |
| Gobemouche gris          | <i>Muscicapa striata</i>      | PN (Art. 3)   |
| Gobemouche noir          | <i>Ficedula hypoleuca</i>     | PN (Art. 3)   |
| Goéland à ailes blanches | <i>Larus glaucoides</i>       | PN (Art. 3)   |
| Goéland argenté          | <i>Larus argentatus</i>       | PN (Art. 3)   |
| Goéland bourgmestre      | <i>Larus hyperboreus</i>      | PN (Art. 4)   |
| Goéland brun             | <i>Larus fuscus</i>           | PN (Art. 3)   |
| Goéland cendré           | <i>Larus canus</i>            | PN (Art. 3)   |
| Goéland leucophée        | <i>Larus michahellis</i>      | PN (Art. 3)   |
| Goéland marin            | <i>Larus marinus</i>          | PN (Art. 3)   |
| Gorgebleue à miroir      | <i>Luscinia svecica</i>       | PN (Art. 3)   |
| Grand Cormoran           | <i>Phalacrocorax carbo</i>    | PN (Art. 3)   |
| Grand Gravelot           | <i>Charadrius hiaticula</i>   | PN (Art. 3)   |
| Grande Aigrette          | <i>Ardea alba</i>             | PN (Art. 3)   |
| Grèbe castagneux         | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | PN (Art. 3)   |
| Grèbe huppé              | <i>Podiceps cristatus</i>     | PN (Art. 3)   |
| Grimpereau des jardins   | <i>Certhia brachydactyla</i>  | PN (Art. 3)   |
| Grive draine             | <i>Turdus viscivorus</i>      | -             |
| Grive litorne            | <i>Turdus pilaris</i>         | -             |
| Grive mauvis             | <i>Turdus iliacus</i>         | -             |
| Grive musicienne         | <i>Turdus philomelos</i>      | -             |

| Nom vernaculaire        | Nom scientifique                     | Protection  |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Grosbec casse-noyaux    | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | PN (Art. 3) |
| Grue cendrée            | <i>Grus grus</i>                     | PN (Art. 3) |
| Harle bièvre            | <i>Mergus merganser</i>              | PN (Art. 3) |
| Héron cendré            | <i>Ardea cinerea</i>                 | PN (Art. 3) |
| Héron garde-bœufs       | <i>Bubulcus ibis</i>                 | PN (Art. 3) |
| Hibou moyen-duc         | <i>Asio otus</i>                     | PN (Art. 3) |
| Hirondelle de fenêtre   | <i>Delichon urbicum</i>              | PN (Art. 3) |
| Hirondelle de rivage    | <i>Riparia riparia</i>               | PN (Art. 3) |
| Hirondelle rustique     | <i>Hirundo rustica</i>               | PN (Art. 3) |
| Huppe fasciée           | <i>Upupa epops</i>                   | PN (Art. 3) |
| Hypolaïs icterine       | <i>Hippolais icterina</i>            | PN (Art. 3) |
| Hypolaïs polyglotte     | <i>Hippolais polyglotta</i>          | PN (Art. 3) |
| Ibis sacré              | <i>Threskiornis aethiopicus</i>      | -           |
| Linotte mélodieuse      | <i>Linaria cannabina</i>             | PN (Art. 3) |
| Locustelle tachetée     | <i>Locustella naevia</i>             | PN (Art. 3) |
| Loriot d'Europe         | <i>Oriolus oriolus</i>               | PN (Art. 3) |
| Martinet noir           | <i>Apus apus</i>                     | PN (Art. 3) |
| Martin-pêcheur d'Europe | <i>Alcedo atthis</i>                 | PN (Art. 3) |
| Merle à plastron        | <i>Turdus torquatus</i>              | PN (Art. 3) |
| Merle noir              | <i>Turdus merula</i>                 | -           |
| Mésange bleue           | <i>Cyanistes caeruleus</i>           | PN (Art. 3) |
| Mésange charbonnière    | <i>Parus major</i>                   | PN (Art. 3) |
| Mésange huppée          | <i>Parus cristatus</i>               | PN (Art. 3) |
| Mésange noire           | <i>Periparus ater</i>                | PN (Art. 3) |
| Mésange nonnette        | <i>Poecile palustris</i>             | PN (Art. 3) |
| Milan noir              | <i>Milvus migrans</i>                | PN (Art. 3) |
| Milan royal             | <i>Milvus milvus</i>                 | PN (Art. 3) |
| Moineau domestique      | <i>Passer domesticus</i>             | PN (Art. 3) |
| Moineau friquet         | <i>Passer montanus</i>               | PN (Art. 3) |
| Mouette mélanocéphale   | <i>Ichthyaelus melanocephalus</i>    | PN (Art. 3) |
| Mouette pygmée          | <i>Hydrocoloeus minutus</i>          | PN (Art. 3) |
| Mouette rieuse          | <i>Chroicocephalus ridibundus</i>    | PN (Art. 3) |
| Nette rousse            | <i>Netta rufina</i>                  | -           |
| Oedicnème criard        | <i>Burhinus oediconemus</i>          | PN (Art. 3) |
| Oie cendrée             | <i>Anser anser</i>                   | -           |
| Oie rieuse              | <i>Anser albifrons</i>               | -           |
| Orite à longue queue    | <i>Aegithalos caudatus</i>           | PN (Art. 3) |
| Perdrix grise           | <i>Perdix perdix</i>                 | -           |
| Perdrix rouge           | <i>Alectoris rufa</i>                | -           |
| Perruche à collier      | <i>Psittacula krameri</i>            | -           |
| Petit Gravelot          | <i>Charadrius dubius</i>             | PN (Art. 3) |
| Phragmite des joncs     | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>    | PN (Art. 3) |
| Pic épeiche             | <i>Dendrocopos major</i>             | PN (Art. 3) |
| Pic épeichette          | <i>Dendrocopos minor</i>             | PN (Art. 3) |
| Pic noir                | <i>Dryocopus martius</i>             | PN (Art. 3) |
| Pic vert                | <i>Picus viridis</i>                 | PN (Art. 3) |
| Pie bavarde             | <i>Pica pica</i>                     | -           |
| Pie-grièche écorcheur   | <i>Lanius collurio</i>               | PN (Art. 3) |
| Pigeon biset            | <i>Columba livia</i>                 | -           |
| Pigeon colombin         | <i>Columba oenas</i>                 | -           |
| Pigeon ramier           | <i>Columba palumbus</i>              | -           |
| Pinson des arbres       | <i>Fringilla coelebs</i>             | PN (Art. 3) |
| Pinson du nord          | <i>Fringilla montifringilla</i>      | PN (Art. 3) |
| Pipit des arbres        | <i>Anthus trivialis</i>              | PN (Art. 3) |



| Nom vernaculaire           | Nom scientifique               | Protection  |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Pipit farlouse             | <i>Anthus pratensis</i>        | PN (Art. 3) |
| Pipit spioncelle           | <i>Anthus spinoletta</i>       | PN (Art. 3) |
| Pluvier argenté            | <i>Pluvialis squatarola</i>    | -           |
| Pluvier doré               | <i>Pluvialis apricaria</i>     | -           |
| Pouillot à grands sourcils | <i>Phylloscopus inornatus</i>  | PN (Art. 4) |
| Pouillot de Bonelli        | <i>Phylloscopus bonelli</i>    | PN (Art. 3) |
| Pouillot fitis             | <i>Phylloscopus trochilus</i>  | PN (Art. 3) |
| Pouillot ibérique          | <i>Phylloscopus ibericus</i>   | PN (Art. 3) |
| Pouillot siffleur          | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | PN (Art. 3) |
| Pouillot véloce            | <i>Phylloscopus collybita</i>  | PN (Art. 3) |
| Pygargue à queue blanche   | <i>Haliaeetus albicilla</i>    | PN (Art. 3) |
| Râle d'eau                 | <i>Rallus aquaticus</i>        | PN (Art. 3) |
| Roitelet à triple bandeau  | <i>Regulus ignicapilla</i>     | PN (Art. 3) |
| Roitelet huppé             | <i>Regulus regulus</i>         | PN (Art. 3) |
| Rossignol philomèle        | <i>Luscinia megarhynchos</i>   | PN (Art. 3) |
| Rougegorge familier        | <i>Erithacus rubecula</i>      | PN (Art. 3) |
| Rougequeue à front blanc   | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | PN (Art. 3) |
| Rougequeue noir            | <i>Phoenicurus ochruros</i>    | PN (Art. 3) |
| Rousserolle effarvatte     | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | PN (Art. 3) |
| Sarcelle d'hiver           | <i>Anas crecca</i>             | -           |
| Serín cini                 | <i>Serinus serinus</i>         | PN (Art. 3) |
| Sittelle torchepot         | <i>Sitta europaea</i>          | PN (Art. 3) |
| Spatule blanche            | <i>Platalea leucorodia</i>     | PN (Art. 3) |
| Sterne caspienne           | <i>Hydroprogne caspia</i>      | PN (Art. 3) |
| Sterne pierregarin         | <i>Sterna hirundo</i>          | PN (Art. 3) |
| Tadorne de Belon           | <i>Tadorna tadorna</i>         | PN (Art. 3) |
| Tarier des prés            | <i>Saxicola rubetra</i>        | PN (Art. 3) |
| Tarier pâtre               | <i>Saxicola torquatus</i>      | PN (Art. 3) |
| Tarin des aulnes           | <i>Spinus spinus</i>           | PN (Art. 3) |
| Torcol fourmilier          | <i>Jynx torquilla</i>          | PN (Art. 3) |
| Tourterelle des bois       | <i>Streptopelia turtur</i>     | -           |
| Tourterelle turque         | <i>Streptopelia decaocto</i>   | -           |
| Traquet motteux            | <i>Oenanthe oenanthe</i>       | PN (Art. 3) |
| Troglodyte mignon          | <i>Troglodytes troglodytes</i> | PN (Art. 3) |
| Vanneau huppé              | <i>Vanellus vanellus</i>       | -           |
| Verdier d'Europe           | <i>Chloris chloris</i>         | PN (Art. 3) |

## 7 ANNEXE 2-7 : BIBLIOGRAPHIE

### Flore et habitats naturels

BENSETTITI F., GAUDILLAT V. & HAURY J. (coord.), 2002 - « Cahiers d'habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome 3 - Habitats humides. MATE/MAP/ MNHN. Éd. La Documentation française, Paris, 457 p.

BISSARDON M. et GUIBAL L., 1997 – CORINE Biotopes. Version originale. Types d’habitats français. ENGREF, Nancy, 217 p.

CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE BREST, 2016. Liste des plantes vasculaires invasives des Pays de la Loire.

DIRECTIVE 92/43/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

DUPONT P., 2001 – Atlas floristique de la Loire-Atlantique et de la Vendée. État et avenir d'un patrimoine. 1 : 1-175, 2 : 1-600, Siloë, Nantes.

EGGENBERG S., MÖHL A., 2013 (2<sup>ème</sup> ed.) – Flora vegetativa. Rossolis, 726 p.

FEDERATION DES CONSERVATOIRES BOTANIQUES NATIONAUX, nd. Fiches descriptives des espèces exotiques envahissantes. [www.fcbn.fr](http://www.fcbn.fr)

GAYET G., BAPTIST F., MACIEJEWSKI L., PONCET R. & BENSETTITI F., 2018. Guide de détermination des habitats terrestres et marins de la typologie EUNIS – version 1.0. AFB, collection Guides et protocoles 230 p.

INVASIVE SPECIES SPECIALIST GROUP, 2017 – Global Invasive Species Database <http://www.iucngisd.org/gisd/>

JULVE P., 1998 - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 13/06/2012. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

LEVY, V. (coord.), WATTERLOT, W., BUCHET, J., TOUSSAINT, B. & HAUGUEL J.-C., 2015. – Plantes exotiques envahissantes du Nord-Ouest de la France : 30 fiches de reconnaissance et d’aide à la gestion. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 140 p. Bailleul.

MACNELLY, J. & STRAHM, W., 1997 - L'U.I.C.N. et les espèces étrangères envahissantes : un cadre d'action, pp. 3-10. In : U.I.C.N. (ed) Conservation de la vitalité et de la diversité. Compte-rendu de l'atelier sur les espèces étrangères envahissantes au Congrès mondial sur la conservation, Ottawa.

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, 2017 – Note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides.

MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE, 2008. Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.

MINISTERE DE L'ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE - Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire.

MINISTERE DE L'ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE – Arrêté du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Pays de la Loire complétant la liste nationale.

MULLER S., (coord.), 2004. Plantes invasives en France. État des connaissances et propositions d'actions. Paris, Muséum National d'Histoire Naturelle, Patrimoines Naturels, 62, 168 p.

TELA BOTANICA, 2016 - e-Flore. [www.tela-botanica.org](http://www.tela-botanica.org)

TISON J. M., DE FOUCAULT B. (Coords), 2014 - Flora Gallica. Flore de France. Biotope, Mèze, xx + 1196 p.

UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018. La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine. Paris, France.

UICN France, FCBN & MNHN (2012). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine : premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et variétés. Dossier électronique.

UICN France, MNHN, FCBN & SFO, 2010 - La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Orchidées de France métropolitaine. Paris, France.

### Arthropodes

BELLMANN H., LUQUET G., 2009 – Guide des sauterelles, grillons et criquets d'Europe occidentale (Delachaux et Niestlé)

BRUSTEL H. 2004 – Coléoptères saproxyliques et valeur biologique des forêts françaises. Collection dossiers forestiers, n°13, février 2004, 289p.

CHARLES J., MERIT X. & MANIL L., 2008 – Les Hespérides de France (Association des Lépidoptéristes de France)

DEFAUT B., 2009 - Présentation synthétique des synusies orthoptériques de France. 1. Les synusies du bioclimat méditerranéen (Oedipodetalia charpentierii). Matériaux Orthoptériques et Entomocénétiques, 2010, 14 (2009) : 111-116

DEFAUT B., 2010 - Présentation synthétique des synusies orthoptériques de France. 2. Les synusies du bioclimat subméditerranéen tempéré (Chorthippetalia binotati). Matériaux Orthoptériques et Entomocénétiques, 2010, 14 (2009) : 117-122

DEFAUT B., SARDET E. & BRAUD Y., 2009 – Catalogue permanent de l’entomofaune française – Orthoptera : Ensifaera et Caelifera, fasc. N°7, ASCETE, Bédailhac-et-Aynat.95 p.

DIJKSTRA, BENEDIKTUS K-D.; LEWINGTON R. et JOURDE P., 2007 - Guide des libellules de France et d'Europe, Delachaux et Niestlé, Paris. Réimpression 2011, 320 p.

DOUCET G., 2011 – Clé de détermination des Exuvies des Odonates de France. 2ème édition – Société Française d'Odonatologie, 68 pages

UPONT, P. (2010). Plan national d’actions en faveur des *Maculinea*. Office pour les insectes et leur environnement-Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, 138 pp.

DUPONT, P. coordination, 2010 - Plan national d’actions en faveur des Odonates. Office pour les insectes et leur environnement / Société Française d'Odonatologie – Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer, 170 pp.

GOUVERNEUR X. & GUERARD P., 2011. – Les longicornes armoricains. Atlas des coléoptères Cerambycidae des départements du Massif armoricain. Invertébrés armoricains, les cahiers du GRECIA, 7. 224p.

GRAND D., BOUDOT J.-P., WILDERMURTH H. & MONNERAT C., 2017 – Les Libellules de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze, (Collection Parthénope), 2<sup>e</sup> éd., 456 pages.

GUILLOTON J.-P., 201. – Atlas des lépidoptères Zygaenidae de la Loire-Atlantique et de la Vendée. Biohistoire et conservation. Lette de l'Atlas entomologique régional, Nantes, 25. 54p.

GUILLOTON J.-P., 2018 – Biohistoire des papillons. Diversité et conservation des lépidoptères rhopalocères en Loire-Atlantique et Vendée. 2<sup>e</sup> état des lieux. Antartik, Nantes, 1-120.

HERES A., 2008 – Les Zygènes de France (Association des Lépidoptéristes de France)

LAFRANCHIS T., JUTZELER D., GUILLOSSON J.Y., KAN P. & B., 2015 – La vie des papillons, Écologie, biologie et comportement des Rhopalocères de France. Editions Diathea

LAFRANCHIS, T., 2000 - Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles, (Mèze France Biotope)

LAFRANCHIS, T., 2014 - Papillons de France, Guide de détermination des papillons diurnes, (Diathea). 351 p.

LE NEVE A. (contact.), 2015. Déclinaison régionale du plan national d’actions en faveur des Odonates – Pays de la Loire - 2012-2015. DREAL Pays de la Loire – Groupe d'Etude des Invertébrés Armoricaains. 202 pp. + annexes

LE NEVE A. & VANNUCCI O., 2015 – Compte-rendu du Copil du PNA Maculinea en Pays de la Loire le 21 janvier 2015. Conservatoire d’espaces naturels de la Sarthe, Le Mans, 1-7.

LE NEVE A. & VANNUCCI O., 2016 – Compte-rendu du Copil du PNA Maculinea en Pays de la Loire le 24 février 2016. Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire, Le Mans, 1-7.

PERRAIN C., et al., 2012 – Biohistoire des papillons. Diversité et conservation des lépidoptères rhopalocères en Loire-Atlantique et Vendée. Presse universitaire de Rennes, Rennes, 1-624.

ROBINEAU R., et al., 2007 – Guide des papillons nocturnes de France (Delachaux et Niestlé)

SARDET E. & DEFAULT B., 2004 – Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénétiques, 9 : 125-137

SARDET E., ROESTI C., BRAUD Y., 2015 – Cahier d'identification des Orthoptères de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze, collection Cahier d'identification, 304p.

UICN France, MNHN, OPIE & SEF, 2012 – Liste rouge des espèces de Rhopalocères menacées de France métropolitaine

UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016 – Liste rouge des espèces d’Odonates menacées de France métropolitaine

**Amphibiens et Reptiles**

ACEMAV COLL., DUGUET R. & MELKI F. ED., 2003 – Les amphibiens de France, Belgique et Luxembourg. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France). 480 p.

DODD K., 2010. – Amphibian ecology and conservation, a Handbook of techniques; Techniques in ecology and conservation series; Oxford biology, 527p.

FIERS V., 2004. – Guide pratique. Principales méthodes d’inventaire et de suivi de la biodiversité. Réserves naturelles de France. 263p.

KWET A., 2015 – Reptiles et amphibiens d’Europe. Collection Delachaux et Niestlé, Paris, 351p.

LEBLANC E., 2014. – Optimisation des techniques d’inventaires des amphibiens grâce à l’acoustique, Naturalia environnement, Université de Montpellier II, 20p.

LESCURE J., de MASSARY J.C., SIBLET J.P., 2013 – Atlas des amphibiens et reptiles de France. Collection Inventaire & Biodiversité. 272p.

MIAUD C., 2014 – Protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies des amphibiens dans la nature à destination des opérateurs de terrain. Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, Université de Savoie et Ecole Pratique des Hautes Etudes, 7p.

MIAUD C. & MURATET J., 2018. – Les Amphibiens de France – Guide d’identification des œufs et des larves. Ed. Quae, France, 225 p.

MURATET J., 2015. – Identifier les reptiles de France métropolitaine. Ed. Ecodiv, France, 530 p.

UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France.

VACHER J.-P. & GENIEZ M. (COODS), 2010. – Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (Collection Parthénope) ; Muséum d’Histoire naturelle, Paris, 544p.

**Mammifères terrestres**

AULAGNIER S., HAFFNER P., MITCHELL - JONES A.J, MOUTOU F. et ZIMA J. 2008 – Guide des mammifères d’Europe, d’Afrique du Nord et Moyen-Orient. Delachaux et Niestlé. 271 p.

BANG P., DAHLSTROM P., 2009 – Guide des traces d’animaux : les indices de présence de la faune sauvage. Collection Delachaux et Niestlé. 264p.

CHAPUIS J.-L. et MARMET J. 2006 – Écureuils d’Europe occidentale : Fiches descriptives. MNHN, Paris. 9 p.

COLLECTIF 2007 – Faune sauvage de France. Biologie, habitats et gestion. Sous la direction de l’ONCFS. Editions du Gerfaut.

DUQUET M. 1995 – Inventaire de la faune de France. Vertébrés et principaux Invertébrés, 2ème ed, Nathan - MNHN. Paris. 416 p.

ETIENNE P., 2005 – La Loutre d’Europe. Collection Les sentiers du naturaliste, 192p.

JOURDE P., 2013 – Le Hérisson d’Europe. Collection Les sentiers du naturaliste, 207p.

MARCHADOUR B., BANASIAK M., BARBOTIN A., BESLOT E., CHENAVAL N., GROSBOIS X., MÊME-LAFOND B., MONTFORT D., MOQUET J., PAILLAT J.-P., PAILLEY P., PERRIN M., ROCHARD N. & VARENNE F., 2020. Liste rouge des mammifères continentaux des Pays de la Loire et responsabilité régionale. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Angers, 20 p.

MARCHANDEAU S., PASCAL M. & VIGNE J.-D., 2003 – Le Lapin de garenne : *Oryctolagus cuniculus* (Linné, 1758). Pages 329-332, *in* : *Évolution holocène de la faune de Vertébrés de France : invasions et disparitions* (M. PASCAL, O. LORVELEC, J.-D. VIGNE, P. KEITH & P. CLERGEAU, coordonnateurs), Institut National de la Recherche Agronomique, Centre National de la Recherche Scientifique, Muséum National d’Histoire Naturelle (381 pages). Rapport au Ministère de l’Écologie et du Développement Durable (Direction de la Nature et des Paysages), Paris, France. Version définitive du 10 juillet 2003.

MARCHESI P., BLANT M., CAPT S., 2008 – Fauna Helvetica : Mammifères identification. Collection Fauna Helvetica 21, 296p.

OISEN L.H., 2013 – Guide Delachaux des traces d’animaux. Collection Delachaux et Niestlé, 272p.

ONCFS 2010. <http://www.oncfs.gouv.fr/Connaître-les-especes-ru73/Le-Lapin-de-garenne-ar975> (rédigé par S. MARCHANDEAU)

QUERE J.P., LE LOUARN H., 2011 – Les rongeurs de France : faunistique et biologie. Collection Guide pratique, 311p.

UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France.

**Chiroptères**

ARTHUR L. et LEMAIRE. M., 1999. Les chauve-souris, maîtresses de la nuit. Lausanne – Paris, Delachaux. 265 p.

ARTHUR L. et LEMAIRE. M., 2009. Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze, (collection Parthénope), MNHN, Paris, 544p.

BARATAUD M. 1992. Reconnaissance des espèces de Chiroptères français à l’aide d’un détecteur d’ultrason : le point sur les possibilités actuelles. In M.d.h. naturelle, (Ed.) Proceedings : Actes du XVIème colloque francophone de mammalogie SFEPM, 1992, Grenoble, SFEPM, 58-68.

BARATAUD, M. 1996. Ballades dans l’in audible. Méthode d’identification acoustique des chauves-souris de France. Double CD + livret. 51 pp. éd. Sittelle.

BARATAUD, M., 2015 – Écologie acoustique des Chiroptères d’Europe, identification des espèces, études de leurs habitats et comportements de chasse. 3e éd. Biotope, Mèze ; Muséum d’Histoire naturelle, Paris (collection Inventaires et biodiversité), 344 p.

BARRE, K., PAUWELS, J., LE VIOL, I., JULIEN, J.-F., JULLIARD, R., CLAIREAU, F., BAS, Y., KERBIRIOU, C., in prep - Robustness of using a semi-automatic method to account for identification errors in bat acoustic surveys. Methods in Ecology and Evolution.

DIETZ C., HELVERSEN O.V et NILL D., 2009. L’encyclopédie des chauve-souris d’Europe et d’Afrique du nord. Delachaux et Niestlé, 395 p.

DIETZ C., KIEFER A., 2015 – Chauves-souris d’Europe : connaître, identifier, protéger. Collection Delachaux et Niestlé, Paris, 399p.

GODINEAU F. et PAIN D., 2007 - Plan de restauration des chiroptères en France métropolitaine, 2008 – 2012 / Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères / Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement Durables. 79 p. + annexes.

MARCHADOUR B., BANASIAK M., BARBOTIN A., BESLOT E., CHENAVAL N., GROSBOIS X., MÊME-LAFOND B., MONTFORT D., MOQUET J., PAILLAT J.-P., PAILLEY P., PERRIN M., ROCHARD N. & VARENNE F., 2020. Liste rouge des mammifères continentaux des Pays de la Loire et responsabilité régionale. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Angers, 20 p.

SAVOURE-SOUBELET, A. 2015. Liste hiérarchisée d’espèces pour la conservation en France. Espèces prioritaires pour l’action publique. V1.1. Muséum national d’histoire naturelle – Service du Patrimoine naturel. 22p

SFEPM 2007. Effectif et état de conservation des chiroptères de l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore en France métropolitaine. Bilan 2004. 33 pp.

TAPIERO, A. (Coord.), 2017. Plan national d’actions en faveur des chiroptères 2016-2025. Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, 83 p.

UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France.

**Oiseaux**

CRAMP, S., (ed) 1980. Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa. The birds of the Western Palearctic. Vol. 2. Oxford University Press, Oxford.

DUBOIS PH. J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. ET YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux de France. Delachaux & Niestlé, 560p.

GËNSBOL, B., 2005. Guide des rapaces diurnes. Delachaux et Niestlé, Paris, 403 p.



GEROUDET P., CUISIN M. (1998) – Les Passereaux d'Europe Tome 1 Des Coucous aux Merles, Paris Delachaux et Niestlé, 405 p.

GEROUDET P., CUISIN M. (1998) – Les Passereaux d'Europe Tome 2 De la Bouscarle aux Bruants, Paris Delachaux et Niestlé, 512 p.

ROCAMORA G. & YEATMAN-BERTHELOT D. (1999) – Oiseaux menacés et à surveiller en France. SEOF/LPO, Paris, 600p

LPO FRANCE, 2017. Actes des 21èmes Rencontres Busards. Circus'laire, n°39-40-41, 24 p.

LANCIEN, B. & ANCGE, 2004 - Dénombrement des vanneaux huppés et des Pluviers dorés en France à la mi-janvier 2004. 37 p.

MARCHADOUR B. (coord.) (2014) - Atlas des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Delachaux et Niestlé, Paris, 576p.

MINISTERE DE L'ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE – Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur de leur protection

ROCAMORA G. & YEATMAN-BERTHELOT D. (1999) – Oiseaux menacés et à surveiller en France. SEOF/LPO, Paris, 600p

SVENSSON L., MULLARNEY K., ZETTERSTRÖM D., GRANT P. J. (2009). Le guide ornitho (Réimpression 2018). Delachaux & Niestlé, (Coll. Les guides du naturaliste), Paris, 446p.

THIOLLAY, J.-M., 2006. Rapaces nicheurs de France : état des populations en 2005 et perspectives d'avenir. Ornithos, 13 (3) : 174-191.

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France.

YEATMAN-BERTHELOT JARRY G. (1994) – Atlas des oiseaux nicheurs de France. SOF, Paris. 776p

