Annexe 3 – Evolution du trait de côte depuis 1952
Parcelle AE230

Pas de recul du trait de côte observé à la plage de Port-Blanc depuis près d'un siècle

La plage de poche de Port Blanc est adossée à de la roche dure migmatite






Positionnement de la projection de GMVA Vs l'indicateur national de l'érosion publié en 2026 par le Céréma


https://cartagene.cerema.fr/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=9dbd12049939465481fe76a126b5298f&page=Page-1

Outre la visualisation très détaillée de l'évolution du trait de côte depuis 1950, le site web propose de la visualiser par périodes : 1950/1975, 1975/2000, 2000/2010, 2010/2020. Depuis 1952 le trait de côte sur la plage Port-Blanc n'a pas évolué. Les informations du Cerema n'ont pas été prises en compte. L'examen d'un expert sur le terrain aurait permis de confronter les projections à la réalité.

Parcelle AE230
Positionnée sur carte Cerema



Recul du trait de côte projeté par GMVA/ISL vs le trait de côte observé par le Cerema depuis 1952




Parcelle AE230 donnant sur la plage de Port Blanc:


Muret délimitant la parcelle


Sentier côtier

Trait de côte stable depuis 1952 comme indiqué par le Céréma en 2026



Recul du trait de côte projeté par GMVA





GMVA – recul du trait de côte

Parcelle AE230 donnant sur la plage de Port Blanc
Roche dure migmatite à très faible érosion: trait de cote couvre le jardin à horizon 30 ans avec un recul de 25m et l'ensemble de la parcelle disparait à 100 ans avec un recul de 50m.

